

用於視線模糊、眼疲勞 Sante 40 Gold®

第3類醫藥品

眼藥

最大濃度配比較骨素*。濕潤、清爽!! ※一般用眼科用藥製造銷售認證標準的最大濃度配比

一般認為因用眼過度及年齡增長，模糊*或疲勞等眼部症狀容易出現且難以恢復。對易出現模糊或疲勞的眼睛提供維生素等營養並進行保養是非常重要的。

Sante 40 Gold 添加了能活化眼睛機能的營養成分(維生素、氨基酸)以及角膜保護性成分硫酸軟骨素鈉，有效改善視線模糊及眼疲勞。

※結膜分泌物較多時



⚠ 使用注意事項

諮詢事項

- 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 正接受醫生治療的人
 - 曾因藥物等引起過敏症狀的人
 - 有以下症狀的人
劇烈的眼睛疼痛
 - 曾接受以下診斷的人
青光眼
- 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹、泛紅、瘙癢
眼睛	充血、瘙癢、腫脹、刺痛

- 以下情形請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 視線模糊未改善時
 - 使用約2星期症狀依然未改善時

用法、用量

一次1~3滴、一日點眼5~6次。

●請遵守以下注意事項。

- 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛(因為可能混入了眼屎或雜菌，會污染藥液或使藥液混濁)。另外，請勿使用混濁的藥劑。
- 請勿在佩戴著軟式隱形眼鏡時使用。
- 請只用於點眼。



適應症

預防視線模糊(結膜分泌物過多時等)、眼疲勞、結膜充血、眼部瘙癢、眼科疾病(如游泳後，灰塵、汗水進入眼睛時等情況)、眼瞼炎(眼瞼接觸性皮炎)、由紫外線等光線引起的眼部炎症(如雪盲等)以及佩戴硬性隱形眼鏡時的不適感


成分、含量

成分	含量	作用
甲基硫酸新斯的明	0.005%	利用焦點調節功能改善作用，改善眼疲勞等。
天然維生素E (d-α-生育酚醋酸酯)	0.05%	促進末梢血管的血液循環。
牛磺酸	0.5%	活化眼睛組織的代謝。
泛醇	0.05%	藉防止淚液蒸發的作用，為雙眼帶來滋潤。
硫酸軟骨素鈉	0.5%	藉防止淚液蒸發的作用，為雙眼帶來滋潤。
撲爾敏	0.03%	抑制組胺的作用，緩解眼部炎症、眼部瘙癢。

作為添加物，含有氨基己酸、依地酸鈉水合物、氯丁醇、香葉醇、右旋糖酐、羥乙基纖維素、羥基氯苯胺、乙氧基化氫化蓖麻油、聚山梨醇酯80、d-龍腦、l-薄荷醇、滲透壓調節劑、Ph值調節劑。

保管及操作注意事項

- 請拴緊後保管在不會直接照射到陽光的陰涼場所。為保持產品品質，請勿放置在汽車內或接近暖氣設備等高溫場所。另外，放置於高溫場所後，會有容器變形、藥液漏出、藥液品質劣化等疑慮，請勿使用。
- 請保管在幼小孩童拿不到的地方。
- 請勿換裝到另一個容器。
(會導致誤用或造成品質的改變。)
- 請勿與他人共用。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。開封後，即使尚在使用期限內，亦請盡快使用。
- 依保存狀態的不同，在容器的點藥口周圍或瓶蓋內側會有白色的成分物結晶。此種情況下，請用清潔的紗布輕輕擦拭後使用。



包裝 12mL

[為愛護自然環境，不附攜帶用袋。敬請見諒。]

諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」電話號碼 0120-127-02 受理時間 9:00~17:00 (週末、例假日除外)

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。