

関節リウマチの治療で**メトレート[®]錠2mg**を 服薬される患者さんへ

効能・効果

関節リウマチ

次の人は主治医に相談してください。

- 妊娠中、授乳中または妊娠を希望する人
- 血液、肝臓、腎臓、肺に障害のある人(または過去にあった人)
- お薬のアレルギーがある人
- 他にお薬をのんでいる人



注意事項

- 1週間のうち、決められた量だけおのみ下さい。
- この薬は関節リウマチの免疫異常を正常に近づけることにより、炎症症状をやわらげますが、効果が出るまでに1～2カ月かかる場合があります。「効果がない」、「症状が治まっている」などの理由から**自分の判断で服薬を中止したり、服薬量を変更したりしないで下さい。**
- お薬をのみ忘れた場合、忘れた分は一度にのみず、次の服薬時から決められた量だけおのみ下さい。
- このお薬をのんでいる間は妊娠しない(させない)下さい。
- このお薬をのんでいる間はなるべくお酒を控えて下さい。
- 主治医の指示に従って定期的に検査を受けて下さい。

服薬後、次のような症状に気付き、異常を感じたら、使用をやめて、**すぐに主治医または薬剤師に相談して下さい。**

■ 風邪のような症状

発熱、のどが痛い、咳、息苦しいなど



■ 皮膚の異常

発しん、かゆみ、紅斑、水ぶくれ、青あざ、皮下出血など



■ その他の異常

むくみ、尿の量が減る、口内炎、体がだるい、
皮膚や白目が黄色くなる、めまい、食欲がない、
むかむかする、腹痛、下痢、
顔色が白くなるなど



他にも何か異常を感じたら、主治医または薬剤師に相談して下さい。

参天製薬株式会社
大阪市東淀川区下新庄3-9-19

関節リウマチの治療で**メトレート[®]錠2mg**を 服薬される患者さんへ

お薬のみ方

このお薬は**1週間**のうち、**決められた日だけ**おのみ下さい。

のみ方の例

1週間にお薬を **2錠** のむ場合

月			火		水	木	金	土	日
朝 8:00	昼	夕 20:00							
			← お薬をのまないで下さい。 →						

1週間にお薬を **3錠** のむ場合

月			火			水	木	金	土	日
朝 8:00	昼	夕 20:00	朝 8:00	昼	夕					
						← お薬をのまないで下さい。 →				

1週間にお薬を **4錠** のむ場合

月			火			水	木	金	土	日
朝 8:00	昼	夕 20:00	朝 8:00	昼	夕					
						← お薬をのまないで下さい。 →				
										

お薬をのむスケジュール

1週間のうち、シートに記載されている月日・曜日だけおのみ下さい。

このシートからPTPのシートを取り外さないで下さい。



若年性特発性関節炎の治療で トレート錠2mgを服薬される患者さんへ

効能・効果

関節症状を伴う若年性特発性関節炎

次の人は主治医に相談してください。

- 妊娠中、授乳中または妊娠を希望する人
- 血液、肝臓、腎臓、肺に障害のある人(または過去にあった人)
- お薬のアレルギーがある人
- 他にお薬をのんでいる人



注意事項

- 1週間のうち、決められた量だけおのみ下さい。
- この薬は若年性特発性関節炎の免疫異常を正常に近づけることにより、炎症症状をやわらげますが、効果が出るまでに1～2カ月かかる場合があります。「効果が無い」、「症状が治まっている」などの理由から**自分の判断で服薬を中止したり、服薬量を変更したりしないで下さい。**
- お薬をのみ忘れた場合、忘れた分は一度にのみず、次の服薬時から決められた量だけおのみ下さい。
- このお薬をのんでいる間は妊娠しない(させない)で下さい。
- 成人の患者さんは、このお薬をのんでいる間はなるべくお酒を控えて下さい。
- 主治医の指示に従って定期的に検査を受けて下さい。

服薬後、次のような症状に気付き、異常を感じたら、使用をやめて、すぐに主治医または薬剤師に相談して下さい。

■ お腹の症状

吐き気、腹痛、下痢、
むかむかするなど



■ 風邪のような症状

発熱、のどが痛い、咳、
息苦しいなど



■ その他の症状

むくみ、尿の量が減る、口内炎、体がだるい、
皮膚や白目が黄色くなる、めまい、食欲がない、
皮膚の異常、顔色が白くなるなど



他にも何か異常を感じたら、主治医または薬剤師に相談して下さい。


参天製薬株式会社
大阪市東淀川区下新庄3-9-19

若年性特発性関節炎の治療で トレート[®]錠2mgを服薬される患者さんへ

お薬のみ方

このお薬は**1週間のうち、決められた日だけ**おのみ下さい。

のみ方の例

 ...お薬をのむ日時

1週間にお薬を **1回** のむ場合

月			火	水	木	金	土	日
朝 8:00	昼	夕						
								

1週間にお薬を **2回に分けて** のむ場合

月			火	水	木	金	土	日
朝 8:00	昼	夕 20:00						
								

1週間にお薬を **3回に分けて** のむ場合

月			火			水	木	金	土	日
朝 8:00	昼	夕 20:00	朝 8:00	昼	夕					
										

お薬をのむスケジュール

1週間のうち、シートに記載されている月日・曜日だけおのみ下さい。

このシートからPTPのシートを取り外さないで下さい。

