

メトレート®錠2mgを服用される患者さんへ

このお薬は、1週間のうち**決められた日**に
決められた量を服用する**関節リウマチ**のお薬です。

毎週決められた曜日から服用を開始し、医師の指示通りに服用してください。

注) 1週間に服用する量は人によって異なります。12時間間隔で服用してください。

あなたの服用は

曜日に開始し、

です。

- 朝
 朝+夕
 朝+夕+朝

1週間毎に同じ服用を繰り返します。



原寸大



(56%縮小)

- 服用日時はシートに記載されています。決められた量だけ服用してください。
- お薬を飲み忘れた場合は、忘れた分は飲まずに飛ばして次の決められた時間に次のお薬を飲んでください。
- 絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。

服用日時

Santen

メトレート錠2mgをより安全にご使用いただくために、
下記の注意事項をよく読んで、正しく服用を続けてください。

お薬の服用に特に注意が必要な方

- 妊娠中、授乳中または妊娠を希望する方
- 肺、血液、腎臓、肝臓に障害のある方(または過去にあった方)
- お薬のアレルギーがある方
- 他にお薬を服用している方

※該当する方は、必ず医師にお伝えください。

お薬服用中の注意点

- お薬の効果が出るまでに**4~8週間かかる場合**があります。
「効果がない」あるいは「症状が治まっている」などの理由で、医師の指示なしに服用を中止したり、服用量を変更したりしないでください。
- 他院を受診される場合は、**このお薬を服用していることを医師にお伝えください。**
- 医師の指示に従って、**定期的に検査を受けてください。**
- お薬の服用中は、女性は妊娠を避けてください。男性は配偶者の方が妊娠しないように注意してください。
- お薬の服用中は、お酒はなるべく控えてください。

次のような異常を感じたら、服用をやめて直ちに医師または薬剤師に相談してください。

● 風邪のような症状

発熱、のどの痛み、
咳、息苦しさ、など



● 皮膚の異常

発疹、かゆみ、
紅斑、水ぶくれ、
青あざ、皮下出血、
など



● その他の異常

むくみ、尿の量・回数が減る、口内炎、
体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる、
めまい、食欲がない、むかむかする、
腹痛、下痢、顔色が白くなる、など



他にも何か異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。