

メトレート錠2mgをより安全にご使用いただくために、
下記の注意事項をよく読んで、正しく服用を続けてください。

お薬の服用に特に注意が必要な方

- 肺、血液、腎臓、肝臓に障害のある方(または過去にあった方)
- お薬のアレルギーがある方
- 他にお薬を飲んでいる方
- 妊娠中、授乳中または妊娠を希望する方 ※該当する方は、必ず医師にお伝えください。

お薬服用中の注意点

- お薬の効果がでるまでに**4～8週間かかる場合**があります。
「効果がない」あるいは「症状が治まっている」などの理由で、医師の指示なしに服用を中止したり、服用量を変更したりしないでください。
- 他院を受診される場合は、**このお薬を服用していることを医師にお伝えください。**
- 医師の指示に従って、**定期的に検査を受けてください。**
- **生ワクチンの予防接種は避けてください。**
- 乳幼児、小児の手の届かないところに保管してください。
- お薬の服用中は、女性は妊娠を避けてください。男性は配偶者の方が妊娠しないように注意してください。
- 成人の方は、お薬の服用中は、なるべくお酒を控えてください。

次のような症状を感じたら、服用をやめて直ちに医師または薬剤師に相談してください。



- **お腹の症状**
腹痛、下痢、
食欲がない、
吐き気、
むかむかする
など



- **風邪のような症状**
発熱、のどの痛み、
咳、息苦しさ など

- **その他の症状**

むくみ、尿の量・回数が減る、口内炎、体がだるい、
皮膚や白目が黄色くなる、めまい、顔色が白くなる、
発疹、かゆみ、紅斑、水ぶくれ、青あざ、皮下出血 など



他にも何か異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。