

リマチル錠50mg リマチル錠100mg を服薬される患者さんへ

効能・効果 関節リウマチ

次の人は主治医に相談してください。

- 妊娠中、授乳中または妊娠を希望する人
- 血液、腎臓、肝臓に障害のある人（または過去にあった人）
- お薬のアレルギーがある人

注意事項

- この薬は関節リウマチの免疫異常を正常に近づけることにより、炎症症状をやわらげますが、効果が得られるまでにある程度の期間（1～3カ月）を要する場合があります。
「効果がない」、「症状が治まっている」などの理由から**自分の判断で服薬を中止したり、服薬量を変更したりしないで下さい。**
- **主治医の指示に従って服薬して下さい。**
- **主治医の指示に従って定期的に検査を受けて下さい。**



服薬後、次のような症状に気づき、異常を感じたら、使用をやめて、すぐに主治医または薬剤師に相談して下さい。

■ 風邪のような症状

発熱、のどが痛い、咳、息苦しいなど



■ その他の異常

むくみ、毛がぬける、爪が黄色くなる、体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる、手足に力が入らない、めまい、目の充血、味覚が変わる、口内炎、食欲がない、むかむかするなど



■ 皮膚の異常


発しん、かゆみ、紅斑、水ぶくれ、青あざ、皮下出血など



■ 尿の異常

尿の色が変わる、たん白尿*

*尿検査をしなければわかりません



他にも何か異常を感じたら、主治医または薬剤師に相談して下さい。