

# リマチル錠50mg リマチル錠100mg を服薬される患者さんへ

効能・効果 慢性関節リウマチ

次の人は主治医に相談してください。

- 妊娠中、授乳中または妊娠を希望する人
- 血液、腎臓、肝臓に障害のある人（または過去にあった人）
- お薬のアレルギーがある人



## 注意事項

- この薬は関節リウマチの免疫異常を正常に近づけることにより、炎症症状をやわらげますが、効果が得られるまでにある程度の期間（1～3カ月）を要する場合があります。  
「効果がない」、「症状が治まっている」などの理由から**自分の判断で服薬を中止したり、服薬量を変更したりしないで下さい。**
- 主治医の指示に従って服薬して下さい。
- 主治医の指示に従って定期的に検査を受けて下さい。

服薬後、次のような症状に気付き、異常を感じたら、使用をやめて、すぐに主治医または薬剤師に相談して下さい。

### ■ 風邪のような症状

発熱、のどが痛い、咳、息苦しいなど



### ■ 皮膚の異常

発しん、かゆみ、  
紅斑、水ぶくれ、  
青あざ、皮下出血など




### ■ その他の異常

むくみ、毛がぬける、爪が黄色くなる、体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる、手足に力が入らない、めまい、目の充血、味覚が変わる、口内炎、食欲がない、むかむかするなど



### ■ 尿の異常

尿の色が変わる、たん白尿\*  
\*尿検査をしなければわかりません



他にも何か異常を感じたら、主治医または薬剤師に相談して下さい。