

# สำหรับดวงตาที่เมื่อยล้าและป้องกันโรคตา

## New Sante de U<sup>®</sup> alfa

ยากลุ่มที่สาม

ยาหยอดตา

### สูตรวิตามินบี 12

จากอายุที่เพิ่มขึ้นและการใช้ดวงตามากเกินไป อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกตาเมื่อยล้าและพร่ามัว, คันตา, และเกิดอาการหนักตาได้ **New Sante de U alfa** ผสมผสานส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ เช่น **วิตามินบี 12** ที่ช่วยเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อตาที่ทำหน้าที่ปรับความใกล้ไกลของจอตา (กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตา), **โซเดียมคอนไดรroitินซัลเฟต** ที่ช่วยปกป้องผิวกระจกตา (กระจกตา) มีสรรพคุณในการลดความเมื่อยล้าของตาและป้องกันโรคตา



### ⚠️ ข้อควรระวังในการใช้



#### ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
  - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาโรคโดยแพทย์
  - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
  - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้
    - เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
  - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ปายตาแล้วเจ็บ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที
  - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
  - เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

### วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

#### ● โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ต้องการใช้นานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา (ตัวยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน เนื่องจากมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและแบคทีเรีย) นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



### สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ

ลดอาการเมื่อยล้าตา, ป้องกันโรคดวงตา (หลังจากว่ายน้ำ, เวลาที่ฝุ่นหรือเหงื่อเข้าตา เป็นต้น), ลดอาการตาพร่ามัว (เมื่อดูในตาสูง), ลดอาการคันตา, เลือดออกใต้เยื่อตา, เปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), ลดการอักเสบของตาเนื่องจากได้รับแสงยูวีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ เป็นต้น), อาการระคายเคืองตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม

### ส่วนประกอบ·ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
วิตามินบี 12 (โซโนบาลามีน)	0.02%	กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตา และบรรเทาความเมื่อยล้าของตา
โซเดียมคอนไดรroitินซัลเฟต	0.5%	ปกป้องและรักษาความชุ่มชื้นให้กระจกตา, ให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตา ด้วยการป้องกันการระเหยของน้ำตา
นีโอสติกมัน เมทอลซัลเฟต	0.005%	คลายความเมื่อยล้าตาโดยการข่มแฉมกล้ามเนื้อตาส่วนที่ปรับโฟกัส
วิตามินบี 6 (ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด์)	0.1%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
โพแทสเซียม แอล แอสปาร์ติก	1.0%	เพิ่มการหายใจของเนื้อเยื่อตา
คลอเฟนิรามีน	0.03%	ยับยั้งการทำงานของฮิสตามีน, ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ-อาการคันตา
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ	0.1%	ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตา


สารประกอบ ประกอบด้วย กรดอะมิโนคาโปรอิก, โซเดียม ฮิเดตเตอไฮดรต, คลอโรฟิวทานอล, เจอรานิโอล, เดกซ์แทรน, ไฮดรอกซี เอทิล เซลลูโลส, เบนซาลโคเนียมคลอไรด์, บอแรกซ์, กรดบอริก, โพลีโซเบต 80, ดี-โบนีออล, แอล-เมนทอล, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

#### <ข้อควรระวังเกี่ยวกับส่วนประกอบ และปริมาณการใช้>

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจรู้สึกหิวในปาก เนื่องจากสารสกัดจากรากชะเอมเทศซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งไหลลงไปในปากผ่านทางท่อ้ำตา ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของคุณภาพยา

### ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป ด้วยซ้ำหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา แม้ว่ายังไม่ได้ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะมีผลึกยาสีแดงติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาทวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเขย่าออกเบาๆ ด้วยผ้าที่สะอาด
- สีแดงของผลิตภัณฑ์นี้ คือ สีของวิตามินบี 12 (โซโนบาลามีน) ในขณะที่หยอดตา หากตัวยารั่วไหลออกมาและหยดลงบนเสื้อ โปรดล้างออกด้วยน้ำทันที



ขนาดบรรจุ 15 มล.

### ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์” หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 – 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้ง่ายในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอะดะโน-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า

www.santen.co.jp