

## 眼疲勞

### 用於佩戴隱形眼鏡時的不適感

第3類醫藥品

# Soft Santear Hitomi Stretch®

眼藥

眼睛沉重、隱形眼鏡有異物不適感...戴隱形眼鏡的眼睛容易疲勞。

**Soft Santear Hitomi Stretch** 以最大濃度\*2添加了兩種能放鬆僵硬眼睛的焦點調節肌肉(睫狀肌)成分\*1。也以最大濃度\*2添加了促進疲勞眼睛組織代謝的維生素B<sub>6</sub>，改善持續用眼的疲勞。  
※可以戴著除了彩色隱形眼鏡以外的所有隱形眼鏡[軟、O<sub>2</sub>、硬、一次性(拋棄)]點眼藥。

\*1 甲基硫酸新斯的明維生素B<sub>12</sub> \*2 一般用眼科用藥製造銷售認證標準的最大濃度配比



眼藥有可以戴著軟性隱形眼鏡使用和不能戴著軟性隱形眼鏡使用的兩種。戴著軟性隱形眼鏡使用眼藥時，要確認外盒和內附的說明書，務必使用可以戴著軟性隱形眼鏡使用的眼藥。

## 使用注意事項



### 諮詢事項

- 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
  - 正接受醫生治療的人
  - 曾因藥物等引起過敏症狀的人
  - 有以下症狀的人  
劇烈的眼睛疼痛
  - 曾接受以下診斷的人  
青光眼
- 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹、泛紅、瘙癢
眼睛	充血、瘙癢、腫脹、刺痛

- 以下情形請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
  - 視線模糊未改善時
  - 使用約2星期症狀依然未改善時


## 用法、用量

一次1~3滴、一日點眼5~6次。

### ●請遵守以下注意事項。

- 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛(因為可能混入了眼屎或雜菌，會污染藥液或使藥液混濁)。另外，請勿使用混濁的藥劑。
- 請只用於點眼。
- 請勿在佩戴著彩色隱形眼鏡時使用。

## 開蓋方式



## 適應症

預防眼疲勞、佩戴軟式或硬性隱形眼鏡時的不適感、眼科疾病(如游泳後、灰塵、汗水進入眼睛時等情況)、視線模糊(結膜分泌物過多時等)

## 成分、含量

成分	含量	作用
維生素B <sub>12</sub> (氰鈷胺)	0.02%	活化睫狀肌的作用，改善眼疲勞。
甲基硫酸新斯的明	0.005%	利用焦點調節功能改善作用，改善眼疲勞等。
維生素B <sub>6</sub> (鹽酸吡哆醇)	0.1%	活化眼睛組織的代謝。

作為添加物，含有依地酸鈉水合物、硼酸、聚維酮、滲透壓調節劑、Ph值調節劑。

## 保管及操作注意事項

- 使用前請勿扭轉瓶蓋。
- 請拧紧後保管在不會直接照射到陽光的陰涼場所。為保持產品品質，請勿放置在汽車內或接近暖氣設備等高溫場所。另外，放置於高溫場所後，會有容器變形、藥液漏出、藥液品質劣化等疑慮，請勿使用。
- 請保管在幼小孩童拿不到的地方。
- 請勿換裝到另一個容器。  
(會導致誤用或造成品質的改變。)
- 請勿與他人共用。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。另外，開封後，即使尚在使用期限內，亦請約1個月內使用。
- 依保存狀態的不同，在容器的點藥口周圍或瓶蓋內側會有紅色的成分物結晶。此種情況下，請用清潔的紗布輕輕擦拭後使用。
- 本藥劑的紅色是維生素B<sub>12</sub>(氰鈷胺)的顏色。點藥中因藥液灑落而使襯衫等染色時，請盡速用清水沖洗。

包裝 5mL×4瓶

## 諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」電話號碼 0120-127-02 受理時間 9:00~17:00 (週末、例假日除外)

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。