

请将本说明书与药品一起保管，请在仔细阅读本说明书后再使用。

Santen

针对视疲劳、眼睛干涩、视力模糊
裸眼或佩戴隐形眼镜均可使用
日本药典 精制玻璃酸钠滴眼液

要指导医药品

滴眼液

Hyalein[®]S

Hyalein S滴眼液，可适用于因泪水不稳定等引起的“视疲劳”“眼睛干涩”“视力模糊”等症状。由于眼睛过度使用或眼睛干燥等情况发生，当眼睛表面的泪水层一旦出现凹凸现象，所见的物体会模糊不清，并导致“视疲劳”等不适症状。Hyalein S所含有效成分玻璃酸钠具有高度锁水功能，给眼睛带来滋润，改善“视疲劳”“眼睛干涩”“视力模糊”等不适症状。

Hyalein S，可在佩戴除彩色隐形眼镜以外的任何隐形眼镜时使用。

软性

O₂

硬性

即抛
(一次性)

没有佩戴隐形眼镜的人士也可以使用。

※部分滴眼液在佩戴软性隐形眼镜时不可使用，请务必确认药品外盒和说明书。

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

下述人群不要使用：

- (1) 因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群；
- (2) 已确诊有下列症状的人群：干眼症、舍格林综合征、史蒂文斯-约翰逊综合征、角膜感染；
- (3) 出现以下症状的人群：视力突然下降、眼睛剧烈疼痛
(可能会导致病症恶化，还请接受医师治疗，切勿自我诊治)



咨询事项

1. 下列人群在使用前请咨询医师或药剂师。

- (1) 正在接受医师治疗的人群
- (2) 因药物等出现过过敏症状的人群
- (3) 除眼睛症状外，还有以下症状的人群
 - 口干、鼻腔干燥
 - 高烧、嘴唇糜烂、喉咙疼痛、皮肤大范围起疹、发红等的持续或急性剧烈恶化
- (4) 已确诊有以下疾病的人群：青光眼

2. 使用后若出现以下症状，则可能是副作用，此时请立即停止使用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红，发痒
眼睛	充血、发痒、肿胀、疼痛、刺激感、异物感、眼屎

3. 出现以下情况时，请停止使用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。

- (1) 眼睛模糊未得到改善时
- (2) 依照用法用量，使用约1周(大概用完第1瓶)，症状仍未得到改善或感觉有异常时(使用第2瓶之前，请咨询医师或药剂师)

4. 即使症状有所改善，但持续使用超过2周时，也请咨询医师或药剂师。

适应症

缓和下列眼睛症状：干燥、异物感(滚动、刺痛感)、疲劳、模糊、佩戴软性隐形眼镜或硬性隐形眼镜时的不适感

用法与用量

请1次1滴、1天滴5-6次。

●请遵守以下注意事项：

- (1) 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用；
- (2) 请勿让容器的前端碰触眼睛、眼睑或睫毛；
(由于眼屎或杂菌等的渗入，药液可能会被污染或变浑浊)，此外，请勿使用已经混浊的药水；
- (3) 请仅用于滴眼；
- (4) 佩戴彩色隐形眼镜时，请勿使用。

开瓶方法

将瓶盖拧至瓶身后……

滴眼液瓶口就会出现开口。




成分与分量

成分	分量
精制玻璃酸钠	0.1%

辅料含有氨基己酸、乙二胺四乙酸二钠盐水合物、葡萄糖酸氯己定溶液、张力剂、酸度调节剂。

保管及使用上的注意事项

- (1) 开始使用之前，请勿扭开瓶盖。
- (2) 避免阳光直射，保管在阴凉干燥处，请勿存放于轿车内或靠近暖气设备等释放高温的位置以维持产品品质。此外，若存放于高温场所，因容器变形导致药液渗漏、药液品质劣化等现象发生时，此时请勿使用。
- (3) 请保管在儿童触碰不到之处。
- (4) 请勿换装至其他容器中。(避免误用或变质)
- (5) 请勿与他人共用。
- (6) 请勿使用过期产品。此外，即使在有效期内，开瓶后请尽快用完。
- (7) 根据保存状态的不同，可能会在滴眼液瓶口周围或瓶盖内侧出现成分的白色结晶物体。若出现此情形，请使用干净的纱布轻轻擦拭。



咨询方式

商品内容相关咨询，请向您购买时的商店或以下窗口联系。

参天制药株式会社“客服咨询室”电话 0120-127-023 受理时间 9:00~17:00 (周六、日、法定节假日除外)

为确保咨询内容正确性与提升回复的质量，您与客服专员的通话将全程录音存档，敬请谅解。

生产销售商 参天制药株式会社 大阪市北区大深町4-20

www.santen.co.jp