

สำหรับอาการตาฝ้า ตาแห้ง และตาพร่ามัว  
สามารถใช้ได้กับตาเปล่าและตาที่ใส่คอนแทคเลนส์  
ยาหยอดตาชนิดน้ำที่มีโซเดียมไฮยาลูโรเนตชนิดบริสุทธิ์มาตรฐานเภสัชตำรับของประเทศญี่ปุ่น

คำแนะนำที่จำเป็นทางเภสัชกรรม

# Hyalein®S

ยาหยอดตาชนิดน้ำ

Hyalein S คือ ยาหยอดตาที่ออกฤทธิ์สำหรับอาการตาฝ้า ตาแห้ง และตาพร่ามัวเนื่องจากน้ำตาไม่คงตัว ถ้าฟิล์มน้ำตาบนผิวของดวงตาคิดปกติเนื่องจากถ้าฟิล์มน้ำตาบนผิวของดวงตาคิดปกติเนื่องจากการทำงานมากเกินไปหรือความแห้งของตา ท่านอาจมีสายตาพร่ามัวและมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ยาก และยังมียาการที่ไม่นำฟิงพอลด้วย เช่น ตาล้ำ โซเดียมไฮยาลูโรเนตเป็นตัวยาออกฤทธิ์ที่มีอยู่ใน Hyalein S มีคุณสมบัติอุ้มน้ำที่ดีเลิศให้ความชื้นแก่ดวงตาและผ่อนคลายอาการที่ไม่นำฟิงพอลให้ดีขึ้น เช่น ตาล้ำ ตาแห้ง และตาพร่ามัว

สามารถใช้ Hyalein S ได้ในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท ยกเว้น คอนแทคเลนส์สี

อ่อน

O<sub>2</sub>

แข็ง

ทิ้งได้

ผู้ที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์สามารถใช้ยาหยอดตานี้ได้

※เนื่องจากยาหยอดตาบางชนิดไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบอ่อนโปรดอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์หรือเอกสารกำกับให้ละเอียด

## ⚠️ ข้อควรระวังในการใช้งาน

**ห้ามทำ**

(ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาการปัจจุบันอาจแย่ลงหรือผลข้างเคียงมีโอกาสเกิดมากขึ้น)

บุคคลต่อไปนี้ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้

- ผู้มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์นี้หรือส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์
- ผู้ได้รับการวินิจฉัยดังต่อไปนี้: ตาแห้ง กลุ่มอาการโจเกรน กลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสัน และการติดเชื้อที่กระจกตา
- ผู้มีอาการดังต่อไปนี้: การเสื่อมสภาพทางสายตาที่ถาวรและถาวร ความปวดรุนแรงในดวงตา (ห้ามทำการรักษาตามวิจารณ์ของแพทย์เอง เพราะอาการอาจแย่ลง โปรดเข้าพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัย)



## การปรึกษา

1. บุคคลต่อไปนี้ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้

- ผู้กำลังรับการรักษาจากแพทย์
- ผู้มีอาการแพ้ยาหรือสารอื่นๆ
- ผู้มีอาการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมจากอาการของดวงตา:
  - ปากแห้งและโพรงจมูกแห้ง
  - ใช้สูงรีมีฟีนอล็อก ฟีบรอลอย ฟีบรอลอยแดงบนผิวหนังสามไม่หยุดหรือหนักขึ้นเล็กน้อย
- ผู้ได้รับการวินิจฉัยดังต่อไปนี้: ต้อหิน

2. ถ้าท่านมีอาการใดดังต่อไปนี้หลังใช้ผลิตภัณฑ์นี้ นั่นอาจเป็นผลข้างเคียง ในกรณีดังกล่าวโปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันที นำแผ่นข้อมูลแผ่นนี้ ไปให้แพทย์หรือเภสัชกร แล้วขอคำปรึกษา

บริเวณที่ได้รับผลกระทบ	อาการ
ผิวหนัง	ผื่น/รอยแดง คัน
ดวงตา	ภาวะเลือดคั่ง คัน บวม ปวด ระคายเคือง เคืองตาเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ ชู้ตา

3. ในกรณีใดก็ตามต่อไปนี้ โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ นำแผ่นข้อมูลแผ่นนี้ไปให้แพทย์หรือเภสัชกร แล้วขอคำปรึกษา

- อาการตาพร่าไม่ดีขึ้น
- อาการไม่ดีขึ้นภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ของการใช้งานตามหัวข้อขนาดและการใช้ (เมื่อท่านกำลังจะใช้หมุดขวดแรก) หรือพบความผิดปกติใดๆ (โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนท่านเริ่มใช้ขวดที่สอง)

4. ถึงแม้ว่าจะมีอาการดีขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถ้าท่านยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนานกว่า 2 สัปดาห์

## ข้อบ่งใช้

การบรรเทาอาการของตาดังต่อไปนี้: แห้ง เคืองตาเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ (รู้สึกมีเม็ดเล็กๆ และทิ่มแทงเบาๆ) ตาล้ำ พร่า และไม่สบายขณะใส่คอนแทคเลนส์แบบอ่อนหรือแข็ง

## ขนาดและการใช้

ค่อยๆ หยอดหนึ่งหยดลงตาข้างที่ได้รับผลกระทบ 5 ถึง 6 ครั้ง ทุกวัน

### ●ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านล่าง

- ถ้าใช้กับเด็ก ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของผู้ปกครองเด็ก
- อย่าให้ปลายที่หยอดตาสัมผัสกับลูกตา เปลือกตา หรือขนตา (อาจติดเชื้อหรือขนตาได้ถ้าใช้ตาหรือเบคที่เรียกผลมไป ในยา) และห้ามใช้ยาที่ขนตาด้วยเช่นกัน
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นยาหยอดตาเท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณกำลังใส่คอนแทคเลนส์

## วิธีเปิดฝา

บิดฝาดวงกระทั้งผ่านกับไหลของขวด

จะเปิดในปลายของขวด




## ส่วนประกอบและปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ
โซเดียมไฮยาลูโรเนตชนิดบริสุทธิ์	0.1%

ผลิตภัณฑ์นี้มีสารเพิ่มปริมาณดังต่อไปนี้: อะมิโนคาโปรเอต, ไดโซเดียม เอเดเตต, ไดโซเดรต, สารละลายคลอรีน, กลูโคเนต, สารปรับสภาพตึงตัว, และสารควบคุมค่า pH

## ข้อควรระวังสำหรับการเก็บรักษาและการดูแล

- ห้ามบิดฝาดวงจนกว่าท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์
- เก็บไว้ในที่เย็น ห่างจากแสงอาทิตย์โดยตรง และปิดผนึกในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ห้ามทิ้งไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือใกล้เครื่องทำความร้อน ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกทิ้งไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิสูง ขวดอาจเสียรูป ทำให้เกิดการรั่วหรือการเสื่อมสภาพของตัวยาห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพดังกล่าว
- เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ไกลมือเด็ก
- ห้ามเทยาเปลี่ยนใส่ภาชนะอื่น (การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นได้)
- ห้ามแบ่งปันผลิตภัณฑ์กับผู้อื่น
- ห้ามใช้ยาที่หมดอายุ ใช้ผลิตภัณฑ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังเปิดขวด แม้ว่าจะเป็นเวลาไม่กี่วันหมดอายุ
- ขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บรักษา ส่วนประกอบอาจตกผลึกและตะกอนขาวสามารถก่อตัวรอบๆ ปลายที่หยอดตาหรือด้านในฝา ในกรณีดังกล่าว ให้เขย่าตะกอนออกเบาๆ ด้วยผ้าก๊อชสะอาดก่อนการใช้งาน



## ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อผู้ขายที่คุณซื้อหรือโทรหาศูนย์ด้านล่าง  
สำนักงานให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า Santen Pharmaceutical Co., Ltd.  
โทรศัพท์: 0120-127-023

ชั่วโมงติดต่อ: 9:00 น. ถึง 17:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สายโทรจากลูกค้าถูกบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับข้อมูลที่แม่นยำ และรักษา/ปรับปรุงคุณภาพของการตอบสนองของเรา