

用于花粉、室尘引起的眼部瘙痒、充血 第2类医药品

Sante AL[®]n 眼科用药

含有6种有效成分

花粉、室尘等造成的眼部过敏，不仅伴有瘙痒及充血等不适症状，还会伴随炎症给眼部组织带来损伤。

Sante ALn 不仅依靠抗组胺剂等有效抑制瘙痒及充血，还含有修复组织因炎症损伤的成分。



⚠ 使用注意事项



需要咨询的情况

- 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - 正在接受医生治疗的人
 - 曾经因为药物出现过敏症状的人
 - 有以下症状的人
眼睛剧烈疼痛
 - 被诊断为以下疾病的人
青光眼
- 使用后如果出现下列症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀、刺痛

- 以下情况请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - 视线模糊未能得到改善的情况
 - 使用了5~6天，症状未得到改善的情况

用法、用量

一次1~3滴，一天点眼5~6次。

●请遵守以下注意事项。

- 如果过度使用，有可能会感到异常的炫目感或者反而会导致眼部充血。
- 儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
- 请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口（结膜分泌物或细菌等有可能会混入眼药中污染眼药或造成眼药混浊）。此外，请勿使用已经混浊的眼药。
- 请勿佩戴着软性隐形眼镜使用。
- 只能作为点眼使用。



适应症

预防眼部瘙痒、结膜充血、眼睑炎（眼睑接触性皮炎）、眼科疾病（如游泳后，灰尘、汗水进入眼睛时等情况）、由紫外线等光线引起的眼部炎症（如雪盲等）、眼疲劳、视线模糊（结膜分泌物过多时等）以及佩戴硬性隐形眼镜时的不适感

成分、分量

成分	分量	功效
扑尔敏 (抗组胺剂)	0.03%	抑制引起过敏症状的组胺的功能，缓解眼部炎症及瘙痒。
甘草酸二钾	0.25%	抑制引起过敏的物质的释放，缓解炎症。
ε-氨基己酸	1.0%	抑制导致炎症的物质的产生。
盐酸四氢唑啉	0.03%	收缩血管，消除结膜（眼白部位）的充血。
牛磺酸	1.0%	激活细胞代谢，促进修复因炎症而受损的眼部组织。
泛醇	0.1%	


作为添加物，本品中含有乙二胺四乙酸二钠水合物、本扎氯铵氯化液、张度剂、pH调节剂。

<关于成分、分量的注意事项>

本眼药水在点眼后，有可能嘴里会感觉到甜味。这是因为作为成分之一的甘草酸二钾通过泪道流入口中造成，不是品质方面的异常。

保管及使用时的注意事项

- 请放在阳光不能直射的阴凉处密封保管。为了保持产品的品质，请勿放置在汽车内或靠近取暖设备等的高温场所。已经放置在高温场所的产品，有可能会发生容器变形、药液泄漏、药液品质劣化，因此请勿继续使用。
- 请放在儿童触及不到的地方妥善保管。
- 请勿替换到其他容器中。（有可能造成误用或品质变质。）
- 请勿与他人共同使用。
- 请勿使用超过使用有效期的产品。另外，即使是在使用有效期内，开封后也请尽快使用。
- 根据保存状态的不同，成分的结晶有可能会令容器的点眼口附近或瓶盖内侧变白。这时请用清洁的纱布轻轻擦拭干净。



包装 15mL

（出于对自然环境的考虑，本品不附带便携袋。敬请理解。）

咨询

有关商品内容的咨询，请联系您购买商品的店铺或者下述联系方式。

参天制药株式会社“顾客咨询室” 电话号码 0120-127-023 受理时间 9:00~17:00（周末、节假日除外）

为了获得咨询内容的正确性，以及为了维持并提高回答的质量，电话将会被录音。