

用於緩解花粉、室塵造成的眼部瘙癢與充血 第2類醫藥品

Sante AL[®]n

眼科用藥

添加6種有效成分

花粉及室塵等造成的眼部過敏，不僅伴有瘙癢及充血等不適的症狀，還會伴隨炎症對眼部組織帶來損傷。

Sante AL n 不僅依靠抗組胺劑等有效抑制瘙癢及充血，還含有修復組織炎症損傷的成分。



⚠ 使用注意事項

諮詢事項

- 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 正接受醫生治療的人
 - 曾因藥物等引起過敏症狀的人
 - 有以下症狀的人
劇烈的眼睛疼痛
 - 曾接受以下診斷的人
青光眼
- 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹、泛紅、瘙癢
眼睛	充血、瘙癢、腫脹、刺痛

- 以下情形請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 視線模糊未改善時
 - 使用5~6天症狀依然未改善時

用法、用量

一次1~3滴、一日點眼5~6次。

●請遵守以下注意事項。

- 若是過度使用，會感覺到異常的眩光，或是反而引起充血。
- 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛（因為可能混入了眼屎或雜菌，會污染藥液或使藥液混濁）。另外，請勿使用混濁的藥劑。
- 請勿在佩戴著軟式隱形眼鏡時使用。
- 請只用於點眼。



適應症

預防眼部瘙癢、結膜充血、眼瞼炎（眼瞼接觸性皮炎）、眼科疾病（如游泳後，灰塵、汗水進入眼睛時等情況）、由紫外線等光線引起的眼部炎症（如雪盲等）、眼疲勞、視線模糊（結膜分泌物過多時等）以及佩戴硬性隱形眼鏡時的不適感

成分、含量

成分	含量	作用
撲爾敏（抗組胺劑）	0.03%	抑制組胺的作用（即過敏症狀的原因），減緩眼部炎症、瘙癢。
甘草酸二鉀	0.25%	抑制過敏成因物質的排放，緩解炎症。
ε-氨基己酸	1.0%	緩解造成炎症成因物質的產生。
鹽酸四氫唑啉	0.03%	使血管收縮，抑制結膜（眼白部分）充血。
牛磺酸	1.0%	活化細胞代謝，促進修復因發炎受損的眼睛組織。
泛醇	0.1%	


作為添加物，含有依地酸鈉水合物、羥基羧苯胺、滲透壓調節劑、Ph值調節劑。

〈成分、容量相關的注意事項〉

本劑於點藥後，偶爾會有在嘴裡感覺到甜味的情況。這是由於其中的甘草酸二鉀成分透過淚腺進入嘴裡而導致的，並非因品質等方面的異常所引起。

保管及操作注意事項

- 請控緊後保管在不會直接照射到陽光的陰涼場所。為保持產品品質，請勿放置在汽車內或接近暖氣設備等高溫場所。另外，放置於高溫場所後，會有容器變形、藥液漏出、藥液品質劣化等疑慮，請勿使用。
- 請保管在幼小孩童拿不到的地方。
- 請勿換裝到另一個容器。（會導致誤用或造成品質的改變。）
- 請勿與他人共用。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。開封後，即使尚在使用期限內，亦請盡快使用。
- 依保存狀態的不同，在容器的點藥口周圍或瓶蓋內側會有白色的成分物結晶。此種情況下，請用清潔的紗布輕輕擦拭後使用。



包裝 15mL

〔為愛護自然環境，不附攜帶用袋。敬請見諒。〕

諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」電話號碼 0120-127-023 受理時間 9:00~17:00（週末、例假日除外）

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。