

# กรุณาเก็บคำอธิบายยานี้ไว้กับยา และ โปรดอ่านอย่างละเอียดทุกครั้งที่จะใช้



สำหรับดวงตาที่เมื่อยล้า, เส้นเลือดฝอยในตาแตก, ป้องกันโรคตา

## Sante BIO®

ยากลุ่มที่สอง

ยาจักษุ

ในสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างปัจจุบัน เราทุกคนต้องใช้ดวงตาอย่างมาก ทำให้เกิดอาการที่พึงประสงค์เกี่ยวกับตาได้ง่าย อาทิเช่น ตาเมื่อยล้า, เส้นเลือดฝอยในตาแตก, ตาล้าไม่สดชื่น เป็นต้น

**Sante BIO** ผสมผสานส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ 7 ชนิด อาทิเช่น วิตามินบี 12 (ไซโนบาลามีน) ที่ส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ปรับความใกล้ไกล (กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตา), นีโอสติกมิน เมทิลซัลเฟตที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมการปรับโฟกัสตา, คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอตที่ช่วยลดการอักเสบของดวงตา เป็นยาหยอดตาเพื่อลดอาการเมื่อยล้าดวงตาและรักษาอาการเส้นเลือดฝอยในตาแตก



### ⚠️ ข้อควรระวังในการใช้



#### ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
  - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาโดยแพทย์
  - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
  - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้
    - เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
  - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีผลข้างเคียง กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ปายตาแล้วเจ็บ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที
  - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
  - เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้ว 5-6 วัน

### วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

#### ● โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- หากใช้ยาเกินขนาด อาจเกิดอาการแสบตา และทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแตกได้
- ในกรณีที่ต้องการใช้ยานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา (ตัวยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน เนื่องจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและเบดที่เรียว) นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



### สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ

ลดอาการเมื่อยล้าตา, เลือดออกใต้เยื่อบุตา, ป้องกันโรคดวงตา (หลังจากว่ายน้ำ, เวลาที่ฝุ่นหรือหิมะเข้าตา เป็นต้น), ลดอาการตาพร่ามัว (เมื่อกในตาสูง), ลดอาการคันตา, เปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), ลดการอักเสบของตาเนื่องจากได้รับแสงยูวีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ เป็นต้น), อาการระคายเคืองตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง

### ส่วนประกอบ·ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
วิตามินบี 12 (ไซโนบาลามีน)	0.02%	กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตา และบรรเทาความเมื่อยล้าของตา
วิตามินบี 6 (ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด์)	0.1%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
แนฟาโซลีน ไฮโดรคลอไรด์	0.002%	ระงับอาการเลือดออกใต้เยื่อบุตา (ส่วนของตาขาว)
คลอร์เฟนิรามีน	0.01%	ยับยั้งการทำงานของฮิสตามีน, ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ-อาการคันตา
นีโอสติกมิน เมทิลซัลเฟต	0.002%	คลายความเมื่อยล้าตาโดยการซ่อมแซมกล้ามเนื้อตาส่วนที่ปรับโฟกัส
ทอรีน	0.1%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ	0.1%	ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตา


สารประกอบ ประกอบด้วย กรดอะมิโนคาโปรอิก, คลอโรฟิวทานอล, เจอรานีโอล, เบนซิลโคโคนิลแอลกอฮอล์, กรดบ

### <ข้อควรระวังเกี่ยวกับส่วนประกอบ และปริมาณการใช้>

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจรู้สึกหวานในปาก เนื่องจากสารสกัดจากรากชะเอมเทศซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งไหลลงไปในปากผ่านทางท่อ น้ำตา ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของคุณภาพยา

### ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป ตัวยารั่วหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา แม้ว่ายังไม่ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะมีผลึกยาสีแสดติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาขวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเช็ดออกเบาๆ ด้วยผ้าที่สะอาด
- สีแสดของผลิตภัณฑ์นี้ คือ สีของวิตามินบี 12 (ไซโนบาลามีน) ในขณะที่หยอดตา หากตัวยารั่วไหลออกมาและหยดลงบนเสื้อ โปรดล้างออกด้วยน้ำทันที



ขนาดบรรจุ 15 mL.

### ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์” หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 – 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้ง่ายในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอะดะโนะ-โจ, คิตะ-คุ, โอซาก้า

www.santen.co.jp