

สำหรับดวงตาที่เมื่อยล้าและป้องกันโรคตา Daigaku Eye Drops®

ยากลุ่มที่สอง

ทีวี, หนังสือพิมพ์, การอ่านเขียน, งานที่ประณีตละเอียดละออ... การใช้สายตามากเกินไปเป็นสาเหตุให้ดวงตาเมื่อยล้า, และเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น (อักเสบหรือเส้นเลือดฝอยในตาแดง)

Daigaku Eye Drops เป็นยาหยอดตาที่ผสมส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ 4 ชนิด อาทิ เช่น ซิงค์ซัลเฟตไฮเดรตที่ช่วยลดอาการอักเสบและสมานแผล, คลอโรเฟนิรามีนมาลีเอตที่ช่วยลดอาการคัน มีสรรพคุณเพื่อขจัดอาการไม่พึงประสงค์ของดวงตาและอาการเมื่อยล้าตา



⚠️ ข้อควรระวังในการใช้



ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
 - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรับการรักษาโดยแพทย์
 - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
 - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้
เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
 - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง
กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

| คำที่เกี่ยวข้อง | อาการโรค |
|-----------------|--|
| ผิวหนัง | ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน |
| ตา | เส้นเลือดฝอยในตาแดง, คัน, บวม, ปายตาแล้วเจ็บ |

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที
 - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
 - เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้ว 5-6 วัน

วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 2-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

● โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- หากใช้ยาเกินขนาด อาจเกิดอาการแสบตา และทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแดงได้
- ในกรณีที่ต้องการใช้นานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา
(ตัวยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน
เนื่องจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและเบตที่เรีย)
นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ

ลดอาการเมื่อยล้าตา, ป้องกันโรคดวงตา (หลังจากว่ายน้ำ, เวลาที่ฝุ่นหรือเหงื่อเข้าตา เป็นต้น),
เลือดออกใต้เยื่อぶตา, ลดอาการคันตา,
ลดการอักเสบของตาเนื่องจากได้รับแสงยูวีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ
เป็นต้น), ลดอาการตาพร่ามัว (เมือกในตาสูง), เปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ),
อาการระคายเคืองตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง


ส่วนประกอบ·ปริมาณ

| ส่วนประกอบ | ปริมาณ | สรรพคุณ |
|------------------------|--------|--|
| ซิงค์ซัลเฟตไฮเดรต | 0.1% | ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตาด้วยฤทธิ์ ต้านการระคายเคือง |
| คลอเฟนิรามีน | 0.01% | ยับยั้งการทำงานของฮีสตามีน, ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ-อาการคันตา |
| แนฟาโซลีน ไฮโดรคลอไรด์ | 0.002% | ระงับอาการเลือดออกใต้เยื่อぶตา (ส่วนของตาขาว) |
| กรดเอปโซลอน | 1.0% | ระงับการผลิตสารที่เป็นสาเหตุของการอักเสบ |

สารประกอบ ประกอบด้วย คลอโรฟนิรามีน, เจอราเนียม, เบนซาลโคเนียมคลอไรด์, กรดบอริก, ดี-ไบบีนอล,
แอล-เมนทอล, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง
เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง
เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ
นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง
อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป
ตัวยาหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาไปยังภาชนะบรรจุอื่น
(อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา
แม้ว่าจะยังไม่ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะมีส่วนผสมยาที่ติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาด
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาใช้ดอกเบาะๆ ด้วยผ้าที่สะอาด



ขนาดบรรจุ 15 มล.

[ยานี้ไม่ได้แนะนำสำหรับพทพามาด้วย ขอขอบคุณที่ใส่ใจและคำนึงในสิ่งแวดล้อม]

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์”
หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 - 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้งานในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

4-20 โอะดะโนะ-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า

www.santen.co.jp

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดูแลดวงตา http://hitomi-sukoyaka.com