

สำหรับดวงตาที่เมื่อยล้าจากอายุและอาการตาแห้ง
ตาฟรั่มัว*1 ผสมส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพในระดับความเข้มข้นสูงสุด*2

ยากลุ่มที่สอง

ยาจักษุ

Sante Medical Active®

เมื่ออายุมากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของดวงตาจะค่อยๆ เสื่อมถอย อันเนื่องมาจากความสามารถในการโฟกัสตาลดลง ปริมาณน้ำตาน้อยลง และอาการตาแห้ง เป็นต้น หากคุณยังคงใช้ดวงตาอย่างหนักภายใต้สภาวะแบบนี้ จะเพิ่มโอกาสในการเกิดปัญหาทางดวงตา อาทิ เช่น เมื่อยล้าตา (โรคตาล้า), ตาฟรั่มัว เป็นต้น

Sante Medical Active ผสมส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ 9 ชนิด รวม 5 องค์ประกอบในระดับความเข้มข้นสูงสุด*2 โดยเน้นที่ วิตามิน เอ (เรตินอล พาร์มีเตด) ที่ช่วยเพิ่มสารการหลั่งน้ำตา (มีวซิน) และทำให้ปริมาณน้ำตามีความเสถียร, โซเดียมคอนไดรอิทินซัลเฟตที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและปกป้องเยื่อบุตา

เป็นยาหยอดตาที่มีสรรพคุณในการชะลอความถดถอยของประสิทธิภาพดวงตา อาทิ เช่น ตาฟรั่มัว*1

หรืออาการเมื่อยล้าตาอันเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้น เรานสนับสนุน "ชีวิตที่มีวิถีทัศน์ที่ชัดเจน" เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีชีวิตชีวา

*1 เวลาที่มีเมือกในตา มาก *2 ส่วนประกอบที่มีความเข้มข้นสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางตา: วิตามิน เอ (เรตินอล พาร์มีเตด), โซเดียมคอนไดรอิทินซัลเฟต, วิตามิน อีธรรมชาติ (ดี อัลฟา โทโคฟีรอล อะซิเตด), นีโอสติกมิน เมทิลซัลเฟต, คลอร์เฟนิรามีนมาซิเอด



ข้อควรระวังในการใช้



ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
 - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรับการรักษาโดยแพทย์
 - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
 - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้
 - เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
 - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแดง, คัน, บวม, ป้ายตาแล้วเจ็บ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที

- อาการตาฟรั่มัวไม่ดีขึ้น
- เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้ว 5-6 วัน

วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

• โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- หากใช้ยาเกินขนาด อาจเกิดอาการแสบตา และทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแดง, คันตา
- ในกรณีที่ต้องการใช้ยานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา (ตัวยาจางปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน เนื่องจากการบินปนของสิ่งสกปรกในตาและเบคทีเรีย) นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ


ลดอาการตาฟรั่มัว (เมือกในตาสูง), ลดอาการตาเมื่อยล้า, เลือดออกใต้เยื่อบุตา, คันตา, ป้องกันโรคดวงตา (หลังจากอายุนี้, เวลาที่ฝุ่นหรือเหงื่อเข้าตา เป็นต้น), เปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), ลดการอักเสบของตาเนื่องจากได้รับ แสงยูวีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ เป็นต้น), อาการระคายเคืองตาอันเนื่องจากการใส่ คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
วิตามิน เอ (เรตินอล พาร์มีเตด)	50,000 หน่วย / 100 มล	กระตุ้นการหลั่งมีวซิน ช่วยรักษาน้ำตาและปกป้องกระจกตา
โซเดียมคอนไดรอิทินซัลเฟต	0.5%	ให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตาดูด้วยอาการปกป้องกระจกตาและป้องกันการระเหยของน้ำตา
วิตามิน อีธรรมชาติ (ดี อัลฟา โทโคฟีรอล อะซิเตด)	0.05%	ช่วยทำให้การไหลเวียนโลหิตของเส้นเลือดฝอยดีขึ้น
ทอรีน	0.5%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
โพแทสเซียม แอล แอสปาร์ติก	0.5%	เพิ่มการหายใจของเนื้อเยื่อตา
นีโอสติกมิน เมทิลซัลเฟต	0.005%	บรรเทาความเมื่อยล้าของดวงตา โดยการช่วยปรับการโฟกัสความไกลใกล้ของตา
คลอร์เฟนิรามีน	0.03%	ยับยั้งการทำงานของฮิสตามีน, ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ-อาการคันตา
กรดเอปโซลอน	1.0%	ระงับการผลิตสารที่เป็นสาเหตุของการอักเสบ
เททริโซลินไฮดรอกไซด์	0.01%	ระงับอาการเลือดออกใต้เยื่อบุตา (ส่วนของตาขาว)

สารประกอบ ประกอบด้วย โซเดียม ฮีเดตไฮเดรต, เดกซ์แทรน, โซเดียม ไฮยาลูโรเนต, ไฮดรอกซี เอทิล เซลลูโลส, เบนซาลโคเนียมคลอไรด์, กรดบอริก, โพลีออกซีทีลีนไฮโดรเจนเนต แคลสเตรออยล์, โพลีเอทิลีน 80, บีเอชที, ดี-บีเอแอล, แอล-เมนทอล, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป ตัวยารั่วหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา แม้ว่าอายุยังไม่ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะยังมีผลยาพิษชาติที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาจวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเข็ดดอกเบาๆ ด้วยผ้าที่สะอาด



ขนาดบรรจุ 12 มล.

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์” หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 - 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้อุ่นใจในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอะดะโนะ-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า
www.santen.co.jp