

สำหรับตาแห้ง·ตาอักเสบ ช่องแฉกกระจกตา\*1 · ผสมส่วนประกอบที่มี  
ประสิทธิภาพในระดับความเข้มข้นสูงสุด อาทิเช่น สารปกป้องกระจกตา\*2

# Sante Medical Guard®EX

ยากลุ่มที่สอง

ยาจักษุ

คนปัจจุบันนี้ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกวันทีกระจกตา (เยื่อบุตาด้านหน้า) เนื่องจากการใช้ดวงตามากเกินไป, การคันตา (คันแล้วเกา), การใส่คอนแทคเลนส์, หรือรังสียูวี

ความเสียหายของกระจกตาที่เกิดเนื่องจากเหตุเหล่านี้หากไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคทางตาหรือตาอักเสบได้

**Sante Medical Guard EX** ผสมส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ 10 ชนิด รวม 6 องค์ประกอบในระดับความเข้มข้นสูงสุด

โดยเน้นที่ฟลาวินแอดนีนไดนิวคลีโอไทด์ไซโตเดียม (แอกทีฟ วิตามินบี 2) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระจกตา,

ไซโตเดียมคอนไดรอกซิมิลเฟต ที่เพิ่มความชุ่มชื้นและปกป้องกระจกตา

เป็นยาหยอดตาที่มีสรรพคุณในการปกป้องและซ่อมแซมกระจกตาที่ได้รับความเสียหาย, ป้องกันตาอักเสบและโรคทางตา

เราใส่ใจในดวงตาอันบอบบางของคุณและสนับสนุน "ชีวิตที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน"



\*1 ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความแข็งแรงและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระจกตา  
\*2 ส่วนประกอบที่มีความเข้มข้นสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางตา : ฟลาวินแอดนีนไดนิวคลีโอไทด์ไซโตเดียม (แอกทีฟ วิตามินบี 2), ไซโตเดียมคอนไดรอกซิมิลเฟต, วิตามินบี 6, นีโอสตีมีน เมทิลซัลเฟต, คอลาเจนพรีนิลมาทาลิเอส, ไดไฮดรอเอซิมิลเออร์ซิเนส

## ⚠️ ข้อควรระวังในการใช้



### ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
  - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาโรคโดยแพทย์
  - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
  - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้  
เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
  - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า  
เป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง  
กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,  
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวแห้ง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแดง, คัน, บวม, ป้ายตาแล้วเจ็บ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,  
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที
  - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
  - เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้ว 5-6 วัน

## วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

### • โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- หากใช้ยาเกินขนาด อาจเกิดอาการแสบตา และทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแดงได้
- ในกรณีที่ต้องการใช้นานกับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา  
(ตัวยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน  
เนื่องจากมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและแบคทีเรีย)  
นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



## สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ

ลดการอักเสบของตาเนื่องจากได้รับแสงยูวีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะเป็นต้น), เปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), ป้องกันโรคดวงตา (เวลาที่ฝุ่นหรือหิมะเข้าตาเป็นต้น), ลดอาการตาเมื่อยล้า, คันตา, ตาพร่ามัว (เมื่อกินตาสูง), เลือดออกที่เยื่อบุตา, อาการระคายเคืองตาอันเนื่องจากการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง

## ส่วนประกอบ·ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
ฟลาวินแอดนีนไดนิวคลีโอไทด์ไซโตเดียม (แอกทีฟ วิตามินบี 2)	0.05%	สร้างเสริมและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระจกตา
ไซโตเดียมคอนไดรอกซิมิลเฟต	0.5%	ให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตาด้วยการปกป้องกระจกตาและป้องกันอาการระคายเคืองตา
ทอรีน	0.5%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
วิตามินบี 6 (ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด์)	0.1%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
โพแทสเซียม แอล แอสปาร์ติก	0.5%	เพิ่มการหายใจของเนื้อเยื่อตา
นีโอสตีมีน เมทิลซัลเฟต	0.005%	คลายความเมื่อยล้าตาโดยการซ่อมแซมกล้ามเนื้อตาส่วนที่ปรับโฟกัส
คอลาเจนพรีนิล	0.03%	ยับยั้งการทำงานของฮีสตามีน, ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ-อาการคันตา
กรดเอปโซลोन	1.0%	ระงับการผลิตสารที่เป็นสาเหตุของอาการอักเสบ
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ	0.25%	ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตา
เตทริไซลีนไฮดรอกไซด์	0.01%	ระงับอาการเลือดออกที่เยื่อบุตา (ส่วนของตาขาว)


สารประกอบ ประกอบด้วย ไซโตเดียม อีเตเดอไฮเดรต, คอลาโรไวทานอล, เจอรานีโอล, เดกซ์แทรน, ไซโตเดียมไฮยาโลโรน, โยโครอกซ์ เอทิล เซลลูโลส, เบนซาลโคเนียมคลอไรด์, บอแรกซ์, โพลีโซลเบต 80, ดี-โบนิล, แอล-มอนทอล, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

### <ข้อควรระวังเกี่ยวกับส่วนประกอบ และปริมาณการใช้>

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจรู้สึกหิวในปาก เนื่องจากสารสกัดจากรากชะเอมเทศซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งไหลลงไปในปากผ่านทางหน้าตา ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของคุณภาพยา

## ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป  
ตัวยาหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา แม้ว่าอายุยังไม่ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะมีผลึกยาสีเหลืองติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาขวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเขย่าออกเบาๆ ด้วยฝ่าที่สะอาด
- สีเหลืองของผลิตภัณฑ์นี้ คือ สีของฟลาวินแอดนีนไดนิวคลีโอไทด์ไซโตเดียม (แอกทีฟ วิตามินบี 2) ในขณะที่หยอดตา หากตัวยาขาวโหลออกมาและหยดลงบนเนื้อเยื่อ โปรดล้างออกด้วยน้ำทันที



ขนาดบรรจุ 12 มล.

## ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์”  
หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 – 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)  
เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อเพิ่มความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอะดิง-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า

www.santen.co.jp