

# 눈의 염증 및 눈의 피로에 Sante PC<sup>®</sup>

제2류의약품

안약



## 블루라이트 등에 의한 빛 손상을 케어

컴퓨터나 스마트폰 모니터에서 나오는 청색빛, 즉 블루라이트는 매일 조금씩 눈에 부담이 되고 있습니다. Sante PC는 눈의 초점 조절 기능을 개선하는 비타민 B12와 각막을 보호하는 콘드로이틴황산 에스터 나트륨, 손상된 눈 조직의 신진대사를 활발히 하는 비타민 B6를 최대 농도 배합\*. 8가지 성분이 눈의 염증과 피로 등을 개선하는 시원한 느낌의 안약입니다. 컴퓨터와 스마트폰 등의 사용 시간이 긴 분의 피로한 눈에 효과를 발휘합니다.

\*일반용 안과용 약 제조 판매 승인 기준의 최대 농도 배합: 비타민 B12, 콘드로이틴황산 에스터 나트륨, 비타민 B6

### ⚠ 사용상의 주의

#### 👤 의사가 필요한 경우

- 다음과 같은 사람은 사용하기 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
  - 의사의 치료를 받고 있는 사람
  - 약 등으로 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
  - 다음과 같은 증상이 있는 사람  
심한 눈의 통증
  - 다음과 같은 진단을 받은 사람  
녹내장
- 사용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.

관계 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부종

- 다음과 같은 경우는 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
  - 눈의 침침함이 개선되지 않을 경우
  - 5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않을 경우

## 용법 및 용량

1회 1~3방울, 1일 5~6회 점안해 주십시오.

### ● 다음의 주의 사항을 지켜 주십시오.

- 과도하게 사용하면 이상 눈부심 현상을 느끼거나 충혈될 수 있습니다.
- 어린이가 사용할 때는 보호자가 지도 감독해 주십시오.
- 용기 끝을 눈이나 눈꺼풀, 속눈썹 등에 닿지 않도록 하십시오(눈곱이나 잡균 등이 들어가 약액이 오염되거나 혼탁해질 수 있습니다). 또한, 혼탁해진 제품은 사용하지 마십시오.
- 소프트 콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마십시오.
- 점안용으로만 사용해 주십시오.




### 트위스트캡의 개봉 방법

반드시 캡을 위로 하고 열어 주십시오.

주의: 용기 중심을 누른 채 열면 약액이 밀려나올 수 있습니다.



●올바른 방법  
뚜껑을 앞으로 비틀니다.



●잘못된 방법  
멈출 때까지 꼭 누릅니다.

## 효능 및 효과

자외선 및 기타 광선에 의한 안염(설맹 등), 눈의 피로, 결막충혈, 눈병 예방(수영 후, 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때 등), 눈의 침침함(눈곱이 많이 끼었을 때 등), 눈의 가려움, 안검염(다래기 염증), 하드 콘택트렌즈를 착용하고 있을 때의 불편감

## 성분 및 용량

성분	분량	효능
비타민 B12 (사이아노코발라민)	0.02%	모양근체의 기능을 활발히 해 눈의 피로를 개선합니다.
콘드로이틴황산 에스터 나트륨	0.5%	눈물의 증발 방지 작용으로 눈에 수분을 공급합니다.
비타민 B6(피리독신염산염)	0.1%	눈 조직의 신진대사를 활발히 합니다.
네오스티그민메틸황산염	0.002%	초점 조절 기능 개선 작용으로 눈의 피로 등을 개선합니다.
타우린	0.1%	눈 조직의 신진대사를 활발히 합니다.
글리시리진산이칼륨	0.1%	눈의 염증을 억제합니다.
클로르페니라민 말레산염	0.01%	히스타민 기능을 억제하고 눈의 염증과 가려움을 억제합니다.
염산테트라히드로졸린	0.03%	결막(흰자위 부분) 충혈을 억제합니다.


아미노카프로산, 에데트산나트륨수화물, 클로로부탄올, 게라니올, 텍스트란, 하이드록시에틸셀룰로스, 벤잘코늄염화물액, 폴리솔베이트 80, d-캠퍼, l-멘톨, 등장화제, pH 조절제를 함유합니다.

### (성분 및 분량 관련 주의 사항)

이 약제는 점안 후 입안에서 단맛을 느낄 수 있습니다. 이것은 성분 중 하나인 글리시리진산이칼륨이 누도(눈물길)를 통과해 입안으로 흘러 들어가 생기는 현상으로 물질 등의 이상은 아닙니다.

## 보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 선선한 곳에 꼭 닫은 상태로 보관해 주십시오. 제품 품질을 유지하기 위해 자동차 안이나 난방기구 가까이 등 고온이 되는 장소에 두지 마십시오. 또한, 고온이 되는 장소에 보관하면 용기가 변형돼 약액이 새거나 약액 품질이 저하될 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 다른 용기에 바꿔넣지 마십시오. (오용 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 다른 사람과 공용하지 마십시오.
- 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용 기한 내라도 개봉 후에는 가능한 한 빨리 사용해 주십시오.
- 보존 상태에 따라서는 성분의 결정이 용기 점안 입구 주위나 뚜껑 안쪽에 빨갱게 될 수 있습니다. 그런 경우는 청결한 거즈로 닦아낸 후 사용해 주십시오.
- 이 약제의 빨간색은 비타민 B12(사이아노코발라민) 색입니다. 점안 중에 실수로 약액이 셔츠 등이 묻은 경우는 빨리 물빨래해 주십시오.



포장 12mL

## 문의처

상품 내용에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 하기 고객센터로 하시기 바랍니다.  
**산텐제약주식회사 [고객상담실]** 전화번호 0120-127-023 접수시간 9:00~17:00 (토요일, 일요일, 경축일은 제외)  
 문의하신 내용은 정확성을 기하기 위해서 또 답변의 질 유지 및 향상을 위해 통화 내용을 녹음하고 있습니다.