

# สำหรับดวงตาที่อักเสบและดวงตาที่เมื่อยล้า

## Sante PC®

ยากลุ่มที่สอง

ยาหยอดตา

### ดูแลดวงตาที่เสียหายจากแสงเช่น บลูไลท์

แสงสีน้ำเงินที่ออกมาจากจอภาพของคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน หรือที่เรียกกันว่า บลูไลท์ นั้น ทำให้เกิดภาวะแก่สายตาคือเล็กน้อยในทุกๆ วัน

**Sante PC** ประกอบด้วยส่วนประกอบในระดับความเข้มข้นสูงสุด \* อาทิ เช่น วิตามินบี 12 ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปรับโฟกัสตา, โซเดียมคอนไดรอินซิลเฟตที่ช่วยปกป้องกระจกตา, วิตามินบี 6 ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตาที่ถูกทำลาย ด้วยส่วนประกอบทั้ง 8 นี้ ช่วยรักษาอาการตาอักเสบและอาการเมื่อยล้าดวงตา อ่อนโยนและให้ดวงตาสดชื่น

มีสรรพคุณที่เหมาะสมกับผู้เมื่อยล้าดวงตาจากการจ้องหน้าจคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์นานเกินไป  
\* ส่วนประกอบที่มีความเข้มข้นสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางตา : วิตามินบี 12, โซเดียมคอนไดรอินซิลเฟต, วิตามินบี 6



### ⚠️ ข้อควรระวังในการใช้

#### 👤 ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
  - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาโดยแพทย์
  - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
  - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้  
เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
  - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า  
เป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง  
กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,  
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,  
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที
  - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
  - เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้ว 5-6 วัน

### วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

#### ● โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- หากใช้ยาเกินขนาด อาจเกิดอาการแสบตา และทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแตกได้
- ในกรณีที่ต้องการใช้ยานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา  
(ตัวยาจางปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน  
เนื่องจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและเบตที่เรียก  
นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



### วิธีการเปิดฝากลีวยา

#### กรุณาเปิดฝาสีชมพูขึ้นบน

หมายเหตุ: หากเปิดฝาสีชมพูขึ้นบน  
ขณะที่กดตรงกลางของ  
ฝากลีวยา  
อาจจะทำให้ตัวยา  
กระเด็นออกมา



### สรรพคุณ-ประสิทธิภาพ

ลดการอักเสบของตาเนื่องจากได้รับแสงยูวีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ เป็นต้น), ลดอาการเมื่อยล้าตา, เลือดออกใต้เยื่อบุตา, ป้องกันโรคดวงตา (หลังจากว่ายน้ำ, เวลาที่ฝนหรือเหงื่อเข้าตา เป็นต้น), ลดอาการตาพร่ามัว (เมื่อกในตาสูง), ลดอาการคันตา, เปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), อาการระคายเคืองตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง

### ส่วนประกอบ-ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
วิตามินบี 12 (โซโนบาลามีน)	0.02%	กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเยื่อเลนส์ตา และบรรเทาความเมื่อยล้าของตา
โซเดียมคอนไดรอินซิลเฟต	0.5%	ช่วยให้ตามีความชุ่มชื้นด้วยการป้องกันการระเหยของน้ำตา
วิตามินบี 6 (ไพโรดอกซิน ไฮโดรคลอไรด์)	0.1%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
นีโอสติมีน เมทอลซิลเฟต	0.002%	คลายความเมื่อยล้าตาโดยการซ่อมแซมกล้ามเนื้อตาส่วนที่ปรับโฟกัส
ทอรีน	0.1%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ	0.1%	ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตา
คลอเฟนิรามีน	0.01%	ยับยั้งการทำงานของฮิสตามีน, ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ-อาการคันตา
เตทริโซลีนไฮดรอกไซด์	0.03%	ระงับอาการเลือดออกใต้เยื่อบุตา (ส่วนของตาขาว)


สารประกอบ ประกอบด้วย กรดอะมิโนคาโปรอิก, โซเดียม อีเดเตดไฮเดรต, คลอโรฟิทานอล, เจอรานิโอล, เดกซ์แทน, ไฮดรอกซี เอทิล เซลลูโลส, เบนซาอิลเมียมคลอไรด์, โพลีซอร์เบต 80, การบูร, แอล-เมนทอล, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

### <ข้อควรระวังเกี่ยวกับส่วนประกอบ และปริมาณการใช้>

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจรู้สึกหวานในปาก  
เนื่องจากสารสกัดจากรากชะเอมเทศซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งไหลลงไปในปากผ่านท่อน้ำตา  
ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของคุณภาพยา

### ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง  
เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง  
เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ  
นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง  
อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป  
ตัวยารั่วหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น  
(อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝามา  
แม้ว่าจะยังไม่ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะรู้สึกแสบตาหรือคันตาบริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝากลีวยา  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเช็ดออกเบาๆ ด้วยผ้าที่สะอาด
- สีแดงของผลิตภัณฑ์นี้ คือ สีของวิตามินบี 12 (โซโนบาลามีน) ในขณะที่หยอดตา  
หากด้วยวิธีไหลออกมาและหยดลงบนเนื้อ โปรดล้างออกด้วยน้ำทันที



ขนาดบรรจุ 12 มล.

### ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์”  
หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 – 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)  
เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้ง่ายในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอเอจิน-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า  
www.santen.co.jp