

## 눈의 피로, 콘택트렌즈 착용 시의 불편감에

제3류의약품

# Soft Santear Hitomi Stretch®

안약

눈이 무겁거나 콘택트렌즈의 이물감이 느껴지는 등 콘택트렌즈를 한 눈은 피로하기 쉽습니다. Soft Santear Hitomi Stretch는 긴장한 눈의 초점 조절근(모양체근)을 풀어주는 성분\*1 2가지를 최대 농도 배합\*2했습니다. 피로한 눈 조직의 신진대사를 촉진하는 비타민 B6도 최대 농도 배합\*2하고 과도한 눈의 피로를 개선합니다.

※ 컬러 콘택트렌즈를 제외한 모든 콘택트렌즈[소프트, O2, 하드, 디스포저블(일회용)]를 착용한 채 점안할 수 있습니다.

\*1 네오스티그민메틸황산염 비타민 B12 \*2 일반용 안과용 약 제조 판매 승인 기준의 최대 농도

안약에는 소프트 콘택트렌즈를 착용 중에 사용할 수 있는 타입과 사용할 수 없는 타입이 있습니다. 소프트 콘택트렌즈를 착용한 채 안약을 사용하는 경우는 겹 상자나 첨부 문서를 확인하고 반드시 소프트 콘택트렌즈 착용 중에 사용할 수 있는 안약을 사용하시기 바랍니다.



### ⚠ 사용상의 주의

#### 문의가 필요한 경우

- 다음과 같은 사람은 사용하기 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
  - 의사의 치료를 받고 있는 사람
  - 약 등으로 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
  - 다음과 같은 증상이 있는 사람  
심한 눈의 통증
  - 다음과 같은 진단을 받은 사람  
녹내장

- 사용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.

관계 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부종, 따갑고 아프다

- 다음과 같은 경우는 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
  - 눈의 침침함이 개선되지 않을 경우
  - 2주일 정도 사용해도 증상이 개선되지 않을 경우

#### 용법 및 용량

1회 1~3방울, 1일 5~6회 점안해 주십시오.

#### ● 다음의 주의 사항을 지켜 주십시오.


- 어린이가 사용할 때는 보호자가 지도 감독해 주십시오.
- 용기 끝을 눈이나 눈꺼풀, 속눈썹 등에 닿지 않도록 하십시오(눈곱이나 잡균 등이 들어가 약액이 오염되거나 혼탁해질 수 있습니다). 또한, 혼탁해진 제품은 사용하지 마십시오.
- 점안용에서만 사용해 주십시오.
- 컬러 콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마십시오.

#### 여는 방법

멈출 때까지 돌리면...



점안구에 구멍이 뚫립니다.



#### 효능 및 효과

눈의 피로, 하드 콘택트렌즈 또는 소프트 콘택트렌즈를 착용했을 때의 불편감, 눈병 예방(수영 후, 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때 등), 눈의 침침함(눈곱이 많이 끼었을 때 등)

#### 성분 및 용량

성분	분량	효능
비타민 B12 (사이아노코발라민)	0.02%	모양근체의 기능을 활발히 해 눈의 피로를 개선합니다.
네오스티그민메틸황산염	0.005%	초점 조절 기능 개선 작용으로 눈의 피로 등을 개선합니다.
비타민 B6(피리독신염산염)	0.1%	눈 조직의 신진대사를 활발히 합니다.

에데트산나트륨수화물, 붕산, 포비돈, 등장화제, pH 조절제를 함유합니다.

#### 보관 및 취급상의 주의

- 사용할 때까지 뚜껑을 비틀지 마십시오.
- 직사광선이 닿지 않는 선선한 곳에 꼭 닫은 상태로 보관해 주십시오. 제품 품질을 유지하기 위해 자동차 안이나 난방기구 가까이 등 고온이 되는 장소에 두지 마십시오. 또한, 고온이 되는 장소에 보관하면 용기가 변형돼 약액이 새거나 약액 품질이 저하될 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 다른 용기에 바꿔넣지 마십시오.  
(오용 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 다른 사람과 공용하지 마십시오.
- 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용 기한 내라도 개봉 후는 약 1개월을 기준으로 사용해 주십시오.
- 보존 상태에 따라서는 성분의 결정이 용기 점안 입구 주위나 뚜껑 안쪽에 빨갛게 낄 수 있습니다. 그런 경우는 청결한 거즈로 닦아낸 후 사용해 주십시오.
- 이 약제의 빨간색은 비타민 B12(사이아노코발라민) 색입니다. 점안 중에 실수로 약액이 셔츠 등이 묻은 경우는 빨리 물빨래해 주십시오.

포장 5mL×4개

#### 문의처

상품 내용에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 하기 고객센터로 하시기 바랍니다.  
**산텐제약주식회사 [고객상담실]** 전화번호 0120-127-023 접수시간 9:00~17:00 (토요일, 일요일, 경축일은 제외)  
 문의하신 내용은 정확성을 기하기 위해서 또 답변의 질 유지 및 향상을 위해 통화 내용을 녹음하고 있습니다.