

## สำหรับดวงตาที่เมื่อยล้า

อาการระคายเคืองตาเวลาใส่คอนแทคเลนส์

# Soft Santear Hitomi Stretch®

ยาในกลุ่มที่สาม

ยาหยอดตา

การใส่คอนแทคเลนส์หรือคอนแทคเลนส์ขาด อาจจะทำให้เกิดอาการเมื่อยตา, ตาหนัก

**Soft Santear Hitomi Stretch** ผสมผสานส่วนประกอบที่ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการโฟกัส (กล้ามเนื้อตา) \* 1 สองชนิดในระดับความเข้มข้นสูงสุด \* 2 และเพิ่มวิตามินบี 6 ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของดวงตาที่เมื่อยล้า ในระดับความเข้มข้นสูงสุด \* 2 เช่นกันเพื่อลดความเมื่อยล้าของตาที่ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่อง

\* สามารถหยอดตาได้ในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท [แบบนิ่ม • O2 • แบบแข็ง • แบบชั่วคราว (ใช้แล้วทิ้ง)] ยกเว้น คอนแทคเลนส์แบบสี \* 1 นีโอสติกมิน เมทิลซัลเฟตและวิตามินบี 12 \* 2 ส่วนประกอบที่มีความเข้มข้นสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและจำหน่ายและเวชภัณฑ์ทางตา



ยาหยอดตามีทั้งแบบที่ใช้หยอดในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มได้และไม่ได้ กรณีที่จะใช้หยอดตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่มนั้น กรุณาอ่านกล่องบรรจุยาหรือคำอธิบายการใช้ที่แนบมากับยาก่อน และกรุณาใช้ยาหยอดตาที่ระบุไว้ใช้กับคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มได้เท่านั้น

### ⚠️ ข้อควรระวังในการใช้



#### ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เกสเซอร์หรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
  - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลโดยแพทย์
  - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
  - ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้
    - เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
  - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เกสเซอร์หรือตัวแทนจำหน่าย

คำที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ปวดตาแล้วเจ็บ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เกสเซอร์หรือตัวแทนจำหน่ายทันที
  - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
  - เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

### วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

#### ● โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ถือว่าการใช้นี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาลัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา (ด้วยอาการเป็นหรือเกิดตะกอน เนื่องจากกรปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและแบคทีเรีย) นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น
- ห้ามใช้ในขณะใส่คอนแทคเลนส์

### วิธีเปิดฝาด

เมื่อหมุนผ่านถึงด้านข้างขวด ...



บริเวณปากหลอดหยดยาจะเป็นรู

### สรรพคุณ · ประสิทธิภาพ

ลดอาการเมื่อยล้าตา, อาการระคายเคืองตาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ทั้งแบบนิ่มและแบบแข็ง, ป้องกันโรคดวงตา (หลังจากว่ายน้ำ, เวลาที่ฝุ่นหรือเหงื่อเข้าตา เป็นต้น), ลดอาการตาพร่ามัว (เมื่ออยู่ในตาสว่าง)

### ส่วนประกอบ · ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
วิตามินบี 12 (โซโนบาลามีน)	0.02%	กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเยื่อเลนส์ตา และบรรเทาความเมื่อยล้าของตา
นีโอสติกมิน เมทิลซัลเฟต	0.005%	คลายความเมื่อยล้าตาโดยการซ่อมแซมกล้ามเนื้อตาส่วนที่ปรับโฟกัส
วิตามินบี 6 (ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด์)	0.1%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา

สารประกอบ ประกอบด้วย โซเดียม, อีเตเตอไฮเดรต, กรดบอริก, โพวโดน, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

### ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดอย่าหมุนเกลียวฝา จนกว่าจะเปิดใช้จริง
- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไมโดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูปตัวร้ายหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือ
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว หลังจากเปิดขวด โปรดใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือนเท่านั้น
- อาจจะมีผลึกยาสีแดงติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาด ที่ขึ้นอยู่กัวิธีเก็บรักษา ในกรณีที่ กรุณาเช็ดออกเบาๆ ด้วยผ้าที่สะอาด
- สีแดงของผลิตภัณฑ์นี้ คือ สีของวิตามินบี 12 (โซโนบาลามีน) ในขณะที่หยอดตา หากด้วยยารั่วไหลออกมาและหยดลงบนเนื้อ โปรดล้างออกด้วยน้ำทันที

ขนาดบรรจุ 5 มล. x 4 ขวด

### ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์” หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 – 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้อุ่นใจในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอะดะโนะ-โจ, คิตะ-คุ, โอซาก้า  
www.santen.co.jp