

인공 누액형 점안제

제3류의약품

Soft Santear®

Soft Santear는 눈물에 가까운 성질을 가지고 있는 인공눈물로 눈물이 부족해 발생하는 안구 건조감과 이물감 등 불편한 증상을 개선합니다.

또한, Soft Santear는 콘택트렌즈에 아무런 영향을 미치지 않는다는 사실을 확인했으므로 모든 타입의 콘택트렌즈[소프트, O2, 하드, 디스포저블(일회용)]를 착용한 채 점안할 수 있습니다. 단, 드라이아이 진단을 받으신 분은 정기적으로 안과 진료를 받으시길 권장합니다.



⚠ 사용상의 주의



문의가 필요한 경우

- 다음과 같은 사람은 사용하기 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 약 등으로 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
 - 다음과 같은 증상이 있는 사람
심한 눈의 통증
 - 다음과 같은 진단을 받은 사람
녹내장

- 사용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.

관계 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부종

- 다음과 같은 경우는 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
 - 눈의 침침함이 개선되지 않을 경우
 - 2주일 정도 사용해도 증상이 개선되지 않을 경우

용법 및 용량

1회 2~3방울, 1일 5~6회 점안해 주십시오.

● 다음의 주의 사항을 지켜 주십시오.


- 어린이가 사용할 때는 보호자가 지도 감독해 주십시오.
- 용기 끝을 눈이나 눈꺼풀, 속눈썹 등에 닿지 않도록 하십시오(눈곱이나 잔균 등이 들어가 약액이 오염되거나 혼탁해질 수 있습니다). 또한, 혼탁해진 제품은 사용하지 마십시오.
- 점안용으로만 사용해 주십시오.

여는 방법

멈출 때까지 돌리면...



점안구에 구멍이 뚫립니다.



효능 및 효과

하드 콘택트렌즈 또는 소프트 콘택트렌즈를 착용했을 때의 불편감, 눈물 보조(안구 건조감), 눈의 피로, 눈의 침침함(눈곱이 많이 끼었을 때 등)

성분 및 용량

성분	분량
염화칼륨	0.1%
염화나트륨	0.4%

붕산, pH 조절제를 함유합니다.

제제의 성상

pH	7.0~8.0
침투압비	0.90~1.20
성상	맑은 무색, 무균 수성 점안제

보관 및 취급상의 주의

- 사용할 때까지 뚜껑을 비틀지 마십시오.
- 직사광선이 닿지 않는 선선한 곳에 꼭 닫은 상태로 보관해 주십시오. 제품 품질을 유지하기 위해 자동차 안이나 난방기구 가까이 등 고온이 되는 장소에 두지 마십시오. 또한, 고온이 되는 장소에 보관하면 용기가 변형돼 약액이 새거나 약액 품질이 저하될 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 다른 용기에 바꿔넣지 마십시오.
(오용 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 다른 사람과 공용하지 마십시오.
- 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용 기한 내라도 개봉 후 약 10일 이상 지난 약액은 사용하지 마십시오.
- 보존 상태에 따라서는 성분의 결정이 용기 점안 입구 주위나 뚜껑 안쪽에 하얗게 낄 수 있습니다. 그런 경우는 청결한 거즈로 닦아낸 후 사용해 주십시오.

포장 5mL×4개

문의처

상품 내용에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 하기 고객센터로 하시기 바랍니다.
산텐제약주식회사 [고객상담실] 전화번호 0120-127-023 접수시간 9:00~17:00 (토요일, 일요일, 경축일은 제외)
 문의하신 내용은 정확성을 기하기 위해서 또 답변의 질 유지 및 향상을 위해 통화 내용을 녹음하고 있습니다.