

눈의 피로 및 눈병 예방에

제3류의약품

Sante de U plus E alfa®

안약

눈의 피로는 수정체를 잡아주는 '모양체근'의 과도한 피로(혹사)가 큰 원인 중의 하나라고 할 수 있습니다.

Sante de U plus E alfa는 모양체근에 직접 작용해 신경 기능을 회복시키는 빨간색 비타민 B12를 비롯해 말초 혈관의 혈류를 좋게 하는 천연 비타민 E 등 5가지의 유효 성분을 배합해 눈의 피로 개선과 눈병 예방 등에 효과적인 안약입니다. 여러분의 '눈을 건강하게' 개선하는 데 사용하시기 바랍니다.



⚠ 사용상의 주의



문의가 필요한 경우

- 다음과 같은 사람은 사용하기 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - (2) 약 등으로 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
 - (3) 다음과 같은 증상이 있는 사람
심한 눈의 통증
 - (4) 다음과 같은 진단을 받은 사람
녹내장
- 사용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.

관계 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부종, 따갑고 아프다

- 다음과 같은 경우는 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
 - (1) 눈의 침침함이 개선되지 않을 경우
 - (2) 2주일 정도 사용해도 증상이 개선되지 않을 경우

효능 및 효과

눈의 피로, 눈병 예방(수영 후, 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때 등), 결막충혈, 눈의 침침함(눈곱이 많이 끼었을 때 등), 눈의 가려움, 안검염(눈꺼풀의 염증), 자외선 등 기타 광선에 의한 안염(설명 등), 하드 콘택트렌즈를 착용했을 때의 불편감

성분 및 용량

성분	분량	효능
비타민 B12 (사이아노코발라민)	0.015%	모양근체의 기능을 활발히 해 눈의 피로를 개선합니다.
천연비타민 E (d-알파-토코페롤아세테이트)	0.02%	말초 혈관의 혈형을 개선합니다.
네오스티그민메틸황산염	0.002%	초점 조절 기능 개선 작용으로 눈의 피로 등을 개선합니다.
클로르페니라민 말레산염	0.01%	히스타민 기능을 억제하고 눈의 염증과 가려움을 억제합니다.
글리시리진산이칼륨	0.1%	눈의 염증을 억제합니다.


아미노카프로산, 에데트산나트륨수화물, 클로로부탄올, 벤잘코늄염화물액, 폴리옥시에틸렌 경화 피마자유, d-보르네올, l-멘톨, 등장화제, pH 조절제를 함유합니다.

(성분 및 분량 관련 주의 사항)

이 약제는 점안 후 입안에서 단맛을 느낄 수 있습니다. 이것은 성분 중 하나인 글리시리진산이칼륨이 누도(눈물길)를 통과해 입안으로 흘러 들어가 생기는 현상으로 물질 등의 이상은 아닙니다.

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 선선한 곳에 꼭 닫은 상태로 보관해 주십시오. 제품 품질을 유지하기 위해 자동차 안이나 난방기구 가까이 등 고온이 되는 장소에 두지 마십시오. 또한, 고온이 되는 장소에 보관하면 용기가 변형돼 약액이 새거나 약액 품질이 저하될 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 다른 용기에 바꿔넣지 마십시오. (오용 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 다른 사람과 공용하지 마십시오.
- 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용 기한 내라도 개봉 후에는 가능한 한 빨리 사용해 주십시오.
- 보존 상태에 따라서는 성분의 결정이 용기 점안 입구 주위나 뚜껑 안쪽에 빨갱게 낄 수 있습니다. 그런 경우는 청결한 거즈로 닦아낸 후 사용해 주십시오.
- 이 약제의 빨간색은 비타민 B12(사이아노코발라민) 색입니다. 점안 중에 실수로 약액이 셔츠 등이 묻은 경우는 빨리 물빨래해 주십시오.



포장 12mL

용법 및 용량

1회 1~3방울, 1일 5~6회 점안해 주십시오.

● 다음의 주의 사항을 지켜 주십시오.

- (1) 어린이가 사용할 때는 보호자가 지도 감독해 주십시오.
- (2) 용기 끝을 눈이나 눈꺼풀, 속눈썹 등에 닿지 않도록 하십시오 (눈곱이나 잔균 등이 들어가 약액이 오염되거나 혼탁해질 수 있습니다). 또한, 혼탁해진 제품은 사용하지 마십시오.
- (3) 소프트 콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마십시오.
- (4) 점안용으로만 사용해 주십시오.



트위스트캡의 개봉 방법

반드시 캡을 위로 하고 열어 주십시오.

주의: 용기 중심을 누른 채 열면 약액이 밀려나올 수 있습니다.



문의처

상품 내용에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 하기 고객센터로 하시기 바랍니다.
산텐제약주식회사 [고객상담실] 전화번호 0120-127-023 접수시간 9:00~17:00 (토요일, 일요일, 경축일은 제외)
문의하신 내용은 정확성을 기하기 위해서 또 답변의 질 유지 및 향상을 위해 통화 내용을 녹음하고 있습니다.