

## 用于预防眼疲劳、眼科疾病

第3类医药品

# Sante de U plus E alfa<sup>®</sup> 眼药

眼疲劳在很大程度上是由于支撑晶状体的“睫状肌”过度疲劳(过劳)引起的。

Sante de U plus E alfa 主要含有直接作用于睫状肌、恢复眼部神经功能的红色维生素B<sub>12</sub>以及改善末梢血管血液循环的天然维生素E等5种有效成分，有效改善眼疲劳并预防眼科疾病等。服务于大众“明眸、健康”的生活。



### 使用注意事项



#### 需要咨询的情况

- 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者。
  - 正在接受医生治疗的人
  - 曾经因为药物出现过敏症状的人
  - 有以下症状的人  
眼睛剧烈疼痛
  - 被诊断为以下疾病的人  
青光眼
- 使用后如果出现下列症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀、刺痛

- 以下情况请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。
  - 视线模糊未能得到改善的情况
  - 使用了2周，症状未得到改善的情况

### 用法、用量

一次1~3滴，一天点眼5~6次。

#### ●请遵守以下注意事项。

- 儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
- 请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口(结膜分泌物或细菌等有可能会混入眼药中污染眼药或造成眼药混浊)。此外，请勿使用已经混浊的眼药。
- 请勿佩戴着软性隐形眼镜使用。
- 只能作为点眼使用。




### 扭转式瓶盖的开盖方法

请务必将瓶盖向上拽起打开。

注：如果按住容器的中心开盖的话，有可能会造成药液溅出。



●打开方法  
将盖子向自己面前拧。



●关闭方法  
充分往下按压，直到停止为止。

### 适应症

预防眼疲劳、眼科疾病(如游泳后，灰尘、汗水进入眼睛时等情况)、结膜充血、视线模糊(结膜分泌物过多时等)、眼部瘙痒、眼睑炎(眼睑接触性皮炎)、由紫外线等光线引起的眼部炎症(如雪盲等)以及佩戴硬性隐形眼镜时的不适感。

### 成分、分量

成分	分量	功效
维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)	0.015%	激发睫状肌的活力，改善眼疲劳。
天然维生素E(d-α-生育酚醋酸酯)	0.02%	改善末梢血管的血液循环。
甲基硫酸新斯的明	0.002%	通过改善聚焦调节功能，缓解眼疲劳等。
扑尔敏	0.01%	抑制组胺的功能，缓解眼部炎症及眼部瘙痒。
甘草酸二钾	0.1%	抑制眼部炎症。


作为添加物，本品中含有氨基酸、乙二胺四乙酸二钠水合物、三氯叔丁醇、本扎氯铵氯化液、聚氧乙烯蓖麻油、右旋龙脑、l-薄荷脑、张度剂、pH调节剂。

#### <关于成分、分量的注意事项>

本眼药水在点眼后，有可能嘴里会感觉到甜味。这是因为作为成分之一的甘草酸二钾通过泪道流入口中造成，不是品质方面的异常。

### 保管及使用时的注意事项

- 请放在阳光不能直射的阴凉处密封保管。为了保持产品的品质，请勿放置在汽车内或靠近取暖设备等的高温场所。已经放置在高温场所的产品，有可能会发生容器变形、药液泄漏、药液品质劣化，因此请勿继续使用。
- 请放在儿童触及不到的地方妥善保管。
- 请勿替换到其他容器中。(有可能造成误用或品质变质。)
- 请勿与他人共同使用。
- 请勿使用超过使用有效期的产品。另外，即使是在使用有效期内，开封后也请尽快使用。
- 根据保存状态的不同，成分的结晶有可能会令容器的点眼口附近或瓶盖内侧变红。这时请用清洁的纱布轻轻擦拭干净。
- 本药剂的红色是维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)的颜色。点眼时，如果药液滴在了衬衫等处并染色的情况下，请立即用水洗净。



包装 12mL

### 咨询

有关商品内容的咨询，请联系您购买商品的店铺或者下述联系方式。

参天制药株式会社“顾客咨询室” 电话号码 0120-127-023 受理时间 9:00~17:00 (周末、节假日除外)

为了获得咨询内容的正确性，以及为了维持并提高回答的质量，电话将会被录音。