

用於眼疲勞及預防眼科疾病

第3類醫藥品

Sante de U plus E alfa[®] 眼藥

眼疲勞可說是因支撐水晶體的「睫狀肌」過度疲勞(過勞)而引起。

Sante de U plus E alfa 主要含有直接作用於睫狀肌、恢復眼部神經功能的紅色維生素B₁₂ 及改善末梢血管血液迴圈的天然維生素E 等5種有效成分，有效改善眼疲勞並預防眼科疾病等。服務各位“明眸·健康”的生活。



使用注意事項

諮詢事項

- 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 正接受醫生活療的人
 - 曾因藥物等引起過敏症狀的人
 - 有以下症狀的人
劇烈的眼睛疼痛
 - 曾接受以下診斷的人
青光眼
- 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹、泛紅、瘙癢
眼睛	充血、瘙癢、腫脹、刺痛

- 以下情形請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 視線模糊未改善時
 - 使用約2星期症狀依然未改善時

用法、用量

一次1~3滴、一日點眼5~6次。

●請遵守以下注意事項。

- 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛(因為可能混入了眼屎或雜菌，會污染藥液或使藥液混濁)。另外，請勿使用混濁的藥劑。
- 請勿在佩戴著軟式隱形眼鏡時使用。
- 請只用於點眼。




旋蓋的開封方式

開啟時請務必將旋蓋朝上。

注：擠壓容器中心進行開封時，可能導致藥液噴出。



●開啟方式
將瓶蓋向著自己轉開。



●關閉方式
直到鎖緊前都要確實壓住。

適應症

預防眼疲勞、眼科疾病(如游泳後，灰塵、汗水進入眼睛時等情況)、結膜充血、視線模糊(結膜分泌物過多時等)、眼部瘙癢、眼瞼炎(眼瞼接觸性皮炎)、由紫外線等光線引起的眼部炎症(如雪盲等)以及佩戴硬性隱形眼鏡時的不適感

成分、含量

成分	含量	作用
維生素B ₁₂ (氰鈷胺)	0.015%	活化睫狀肌的作用，改善眼疲勞。
天然維生素E (d-α-生育酚醋酸酯)	0.02%	促進末梢血管的血液循環。
甲基硫酸新斯的明	0.002%	利用焦點調節功能改善作用，改善眼疲勞等。
撲爾敏	0.01%	抑制組胺的作用，緩解眼部炎症、眼部瘙癢。
甘草酸二鉀	0.1%	抑制眼部炎症。


作為添加物，含有氨基己酸、依地酸鈉水合物、氯丁醇、羥基氯茶胺、乙氧基化氫化蓖麻油、d-龍腦、l-薄荷醇、滲透壓調節劑、Ph值調節劑。

〈成分、容量相關的注意事項〉

本劑於點藥後，偶爾會有在嘴裡感覺到甜味的情況。這是由於其中的甘草酸二鉀成分透過淚腺進入嘴裡而導致的，並非因品質等方面的異常所引起。

保管及操作注意事項

- 請控緊後保管在不直接照射到陽光的陰涼場所。為保持產品品質，請勿放置在汽車內或接近暖氣設備等高溫場所。另外，放置於高溫場所後，會有容器變形、藥液漏出、藥液品質劣化等疑慮，請勿使用。
- 請保管在幼小孩童拿不到的地方。
- 請勿換裝到另一個容器。
(會導致誤用或造成品質的改變。)
- 請勿與他人共用。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。開封後，即使尚在使用期限內，亦請盡快使用。
- 依保存狀態的不同，在容器的點藥口周圍或瓶蓋內側會有紅色的成分物結晶。此種情況下，請用清潔的紗布輕輕擦拭後使用。
- 本藥劑的紅色是維生素B₁₂(氰鈷胺)的顏色。點藥中因藥液灑落而使襯衫等染色時，請盡速用清水沖洗。



包裝 12mL

諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」電話號碼 0120-127-02 受理時間 9:00~17:00 (週末、例假日除外)

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。