

이 설명서는 약과 함께 보관하고 사용하실 때는 잘 읽어주시기 바랍니다.

눈 가려움에 최강의 상쾌감*

Sante FX AL

제2류의약품

안약



Sante FX AL 은 최강의 상쾌감*으로 눈 가려움을 시원하게 없애주는 안약입니다. 알레르기 발생을 원인부터 차단함과 동시에 가려움의 원인인 히스타민을 차단하여 염증을 억제합니다.

최강의 상쾌감*이 눈동자 전체에 퍼지며 작용해 쉬지 않고 일하는 당신의 눈동자를 지원합니다.
*당사 제품 중에서 가장 높은 청량감 레벨

⚠ 사용상의 주의

⊗ 금지 사항

(지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용, 사고가 발생하기 쉽습니다)

- 다음과 같은 사람은 사용하지 마세요.
본체 또는 본체 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 점비약과 병용할 때는 사용 후 자동차나 기계류의 운전 조작은 하지 마세요.
(졸리는 등의 증상이 나타날 수 있습니다)



문의가 필요한 경우

- 다음과 같은 사람은 사용하기 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의해 주세요.
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 감각작용법 등 알레르기 치료를 받고 있는 사람
 - 임부 또는 임신이 의심되는 사람
 - 약 등으로 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
 - 다음과 같은 증상이 있는 사람: 심한 눈의 통증
 - 다음과 같은 진단을 받은 사람: 녹내장
 - 알레르기 증상인지 다른 원인에 의한 증상인지 확실하지 않은 사람
특히 다음과 같은 경우는 알레르기 증상이라고 단정할 수 없으므로 사용하기 전에 의사의 진단을 받아 주세요.
 - 한쪽 눈에만 증상이 있는 경우
 - 눈에만 증상이 나타나고 코에는 증상이 나타나지 않은 경우
 - 시력에도 영향이 있는 경우
- 사용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의해 주세요.

관계 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부종, 통증

드물게 다음과 같은 중독 증상이 나타나는 경우가 있습니다. 그런 경우는 즉시 의사의 진단을 받아 주세요.

증상의 명칭	증상
쇼크 (아나필락시스)	사용 후 바로 피부의 가려움, 두드러기, 목소리 갈라짐, 재채기, 목의 가려움, 호흡곤란, 동기, 의식 혼탁 등이 나타난다

- 다음과 같은 경우는 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의해 주세요.
 - 눈 침침함이 개선되지 않을 경우
 - 2일 동안 사용해도 증상이 개선되지 않을 경우
- 증상이 개선된 것처럼 느껴져도 2주일 이상 사용하는 경우는 이 설명서를 가지고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의해 주세요.

용법 및 용량

1회 1~2방울, 1일 4~6회 점안해 주세요.

(용법 및 용량 관련 주의 사항)

- 용법 및 용량을 엄수해 주세요.
- 어린이가 사용할 때는 보호자가 지도 감독해 주세요.
- 용기 끝이 눈이나 눈꺼풀, 속눈썹 등에 닿지 않도록 하세요(눈곱이나 잡균 등이 들어가 약액이 오염되거나 혼탁해질 수 있습니다). 또한, 혼탁해진 제품은 사용하지 마세요.
- 콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마세요.
- 점안용으로만 사용해 주세요.




트위스트 캡의 개봉 방법

반드시 캡을 위로 하고 열어 주세요.

주의: 용기 중심을 누른 채 열면 약액이 밀려 나올 수 있습니다.



●여는 방법
엄지손가락 전체로 뚜껑을 잡고 엄지손가락 전체로 비틀니다.



●닫는 방법
엄출 때까지 꼭 누릅니다.

효능 및 효과

꽃가루, 집먼지진드기(실내 먼지) 등에 의한 다음과 같은 눈 알레르기 증상 완화: 눈 가려움, 눈 충혈, 눈 침침함(눈곱이 많이 끼었을 때 등), 눈물량 증가, 이물감(눈에 뭔가 들어간 느낌)


성분 및 분량

성분	분량	효능
크로모글리크산나트륨	1.0%	히스타민 등의 방출을 억제해 눈 가려움과 눈 충혈을 억제합니다.
클로르페니라민 말레산염	0.03%	히스타민 기능을 억제하고 눈의 염증과 가려움을 억제합니다.
엡실론-아미노카프로산	1.0%	염증 원인 물질의 생산을 억제합니다.
타우린	1.0%	눈의 조직 대사를 활발히 합니다.
L-아스파라긴산칼륨	1.0%	눈 조직의 호흡을 높입니다.

에데트산나트륨수화물, 클로로부탄올, 벤잘코늄염화물, d-캠페르, d-보르네올, l-멘톨, pH 조절제를 함유합니다.

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 꼭 닫은 상태로 보관해 주세요. 제품 품질을 유지하기 위해 자동차 안이나 난방기구 가까이 등 고온이 되는 장소에 두지 마세요. 또한, 고온이 되는 장소에 방치했던 제품은 용기가 변형돼 약액이 새거나 약액 품질이 저하될 우려가 있으므로 사용하지 마세요.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.
- 다른 용기에 바꿔 넣지 마세요.
(오용 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 다른 사람과 함께 사용하지 마세요.
- 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마세요. 또한, 사용 기한 내라도 개봉 후에는 가능한 빨리 사용해 주세요.
- 보존 상태에 따라서는 성분의 결정이 용기 점안 입구 주위나 뚜껑 안쪽에 하얗게 낄 수 있습니다. 그런 경우는 청결한 거즈로 가볍게 닦아내고 사용해 주세요.



포장

12mL

[자연환경을 배려해 휴대용 봉지는 첨부하지 않았습니다. 양해해 주시기 바랍니다.]

문의처

상품 내용에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 하기 고객센터로 하시기 바랍니다.
산텐제약주식회사 [고객상담실] 전화번호 0120-127-023 접수시간 9:00~17:00 (토요일, 일요일, 경축일은 제외)
 문의하신 내용은 정확성을 기하기 위해서 또 답변의 질 유지 및 향상을 위해 통화 내용을 녹음하고 있습니다.