

请将本说明书与药品一同妥善保管，使用时请务必认真阅读。

抑制眼部瘙痒，带来强效的爽快感* Sante FX AL

第2类医药品

眼药



Sante FX AL 是一款以强劲的爽快感*有效消除眼部瘙痒的眼药。
从对过敏的源头进行控制，同时控制导致瘙痒的组胺，从而抑制炎症。
以强劲的爽快感*唤醒您的眼睛，支援您持续工作的眼睛。

*本公司产品中最高水平的清凉感

使用注意事项

禁止事项

(如果不遵守禁止事项，则有可能导致当前症状恶化或产生副作用、事故)

- 以下人群请勿使用本品。
因本品或本品成分导致过敏症状的人
- 如果与点鼻药同时使用，则在使用后请勿驾驶机动车或进行机械类操作。(有可能出现瞌睡等情况)



咨询事项

- 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - 正在接受医生治疗的人
 - 正在接受脱敏疗法等抗过敏治疗的人
 - 孕妇或认为已怀孕的人
 - 曾经因为药物出现过敏症状的人
 - 有以下症状的人：眼睛剧烈疼痛
 - 被诊断为以下疾病的人：青光眼
 - 有尚未明确是过敏导致的症状还是其他原因导致的症状的人
特别是在以下情况下无法断定是否属于过敏导致的症状，所以请在使用前咨询医生。
 - 仅有一侧眼睛出现症状的情况
 - 仅有眼睛出现症状，鼻子未发现症状的情况
 - 影响视力的情况

- 使用后如果出现下列症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀、刺痛

极罕见地有可能出现以下严重症状。如果出现这种情况，请立即接受医生治疗。

症状名称	症状
休克 (过敏反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙瘙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

- 以下情况请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - 视线模糊未能得到改善的情况
 - 使用了2天，症状未得到改善的情况
- 如果使用超过2周后症状得到改善，也请携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。

用法、用量

一次1~2滴，一天点眼4~6次。

《用法和用量的相关注意事项》

- 请严格遵守用法和用量。
- 儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
- 请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口(结膜分泌物或细菌等有可能会混入眼药中污染眼药或造成眼药混浊)。此外，请勿使用已经混浊的眼药。
- 请勿佩戴着隐形眼镜使用。
- 只能作为点眼使用。



扭转式瓶盖的开盖方法

请务必将瓶盖向上拽起打开。

注：如果按住容器的中心开盖的话，有可能会造成药液溅出。



●打开方法
用整个拇指拿着盖子，并用整个拇指指。



●关闭方法
充分往下按压，直到停住为止。

适应症

缓解花粉或室内灰尘等导致的以下眼部过敏症状：眼部瘙痒、眼部充血、视线模糊(结膜分泌物过多时等)、多泪、异物感(有异物滚动的感觉)


成分、分量

成分	分量	功效
色甘酸钠	1.0%	抑制组胺等的分泌，抑制眼部瘙痒、眼部充血。
扑尔敏	0.03%	抑制组胺的作用，抑制眼部炎症、眼部瘙痒。
ε-氨基己酸	1.0%	抑制导致炎症的物质的产生。
牛磺酸	1.0%	激活眼睛的组织代谢。
L-天门冬氨酸钾	1.0%	提高眼部组织的呼吸。

作为添加物，本品中含有乙二胺四乙酸二钠滴定液、氯丁醇、苯扎氯铵、d-樟脑、d-龙脑、l-薄荷脑、pH调节剂。

保管及使用时的注意事项

- 请放在阳光不能直射的阴凉处密封保管。为了保持产品的品质，请勿放置在汽车内或靠近取暖设备等的高温场所。已经放置在高温场所的产品，有可能会发生容器变形、药液泄漏、药液品质劣化，因此请勿继续使用。
- 请放在儿童触及不到的地方妥善保管。
- 请勿替换到其他容器中。(有可能造成误用或品质变质。)
- 请勿与他人共同使用。
- 请勿使用超过使用有效期的产品。另外，即使是在使用有效期内，开封后也请尽快使用。
- 根据保存状态的不同，成分的结晶有可能会令容器的点眼口附近或瓶盖内侧变白。这时请用清洁的纱布轻轻擦拭干净。



包装 12mL

(出于对自然环境的考虑，本品不附带便携袋。敬请理解。)

咨询

有关商品内容的咨询，请联系您购买商品的店铺或者下述联系方式。

参天制药株式会社“顾客咨询室” 电话号码 0120-127-023 受理时间 9:00~17:00 (周末、节假日除外)

为了获得咨询内容的正确性，以及为了维持并提高回答的质量，电话将会被录音。