

本說明書請與藥劑一起保管，使用時，請仔細閱讀。



眼睛發癢時最強效的爽快感*

Sante FX AL

第2類醫藥品

眼藥

Sante FX AL 是透過最強效清涼爽快感*，有效緩解眼睛癢以獲紓解的眼藥水。

屏除造成過敏原因的源頭，並抑制引起搔癢症狀的組織胺，緩解發炎症狀。

最強效的清涼爽快感* 明亮你的眼睛，救援長時間使用後的眼睛。

*本公司所有產品中最強效等級的清涼感

⚠ 使用注意事項

❌ 禁止事項

(若不遵守可能使現在的症狀更加惡化，或容易引起副作用及事故)

1. 有下列情形者，請勿使用。
曾因本藥劑或本藥劑成分引起過敏症狀的人
2. 若與點鼻藥劑併用，使用後請勿操作交通工具或機械類。
(可能出現嗜睡症狀)



諮詢事項

1. 有以下情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。
 - (1) 正在接受醫師治療者
 - (2) 正在接受減敏療法等過敏治療者
 - (3) 孕婦或可能已懷孕者
 - (4) 曾對藥物等產生過敏反應者
 - (5) 有以下症狀者：眼睛有劇烈的刺痛感
 - (6) 以下病症確診者：青光眼
 - (7) 無法確定為過敏或其他因素所引起之症狀者
特別是出現以下症狀，無法判斷是否因過敏所引起時，請於使用前諮詢醫師。
 - 只有單眼出現症狀
 - 只有眼睛出現症狀，鼻子未出現症狀
 - 對視力造成影響

2. 使用本藥劑後，若發生以下副作用所引起之症狀，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

關聯部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢
眼睛	充血、搔癢、浮腫、刺痛

偶有發生以下重症之可能性。發生時，請立即接受醫師診治。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性休克)	使用後立即出現皮膚搔癢、蕁麻疹、喉嚨沙啞、嘔吐、喉嚨搔癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀時

3. 發生以下狀況時，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。
 - (1) 眼睛的搔癢狀態不見改善
 - (2) 連續使用2日仍不見改善
4. 症狀有所改善但連續使用超過2週以上時，請持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

用法、用量

一次1~2滴、一日點眼4~6次。

〈關於用法用量注意事項〉

- (1) 請確實遵守用法與用量。
- (2) 使用於兒童身上時，請務必在家長指導監督下使用。
- (3) 容器先端請勿碰觸眼睛、眼瞼、睫毛(可能因混入眼睛分泌物或細菌等而造成藥水汙染，或變成混濁等情形)。此外，藥水變混濁時請勿繼續使用。
- (4) 請勿在配戴隱形眼鏡狀態下使用。
- (5) 僅作為點眼用藥水使用。



旋蓋的開封方式

開啟時請務必將旋蓋朝上。

注：擠壓容器中心進行開封時，可能導致藥液噴出。



● 開啟方式
以整個拇指拿住瓶蓋，並用整個拇指來扭轉。



● 關閉方式
直到鎖緊前都要確實壓住。

適應症

可舒緩花粉、塵埃(室內灰塵)等所引起之下列眼睛過敏症狀：眼睛搔癢、眼睛充血、視力模糊(眼睛分泌物變多等)、流眼水、異物感(眼中有顆粒感)


成分、含量

成分	含量	作用
色甘酸鈉	1.0%	抑制組織胺的釋放，緩解眼睛搔癢及充血。
撲爾敏	0.03%	抑制組織胺的作用，緩解眼睛發炎及搔癢。
ε-氨基己酸	1.0%	抑制造成發炎之原因物質的生成。
牛磺酸	1.0%	活化眼睛的組織代謝。
L-天門冬氨酸鉀	1.0%	提高眼睛組織呼吸。

作為添加物，含有依地酸鈉水合物、氯丁醇、氯化苯二甲煙鈹、d-樟腦、d-龍腦、l-薄荷腦、pH值調節劑。

保管及操作注意事項

- (1) 請蓋緊後保管於不受陽光直射的陰涼場所。為維持產品品質，請避免放置於汽車內或靠近暖氣機具等高溫場所。此外，放置於高溫場所後，可能造成容器變形或藥水外漏等使藥水品質劣化，請勿繼續使用。
- (2) 請保存於兒童無法拿取處。
- (3) 請勿以其他容器盛裝。(可能造成誤用或變質。)
- (4) 請避免與他人共用。
- (5) 請勿使用超過保存期限的製品。即使尚未超過保存期限，開封後請盡速使用。
- (6) 依保存狀態可能造成容器點眼藥口周圍產生成分結晶，或是在瓶蓋內有白色附著物。請以乾淨的紗布輕輕擦拭後再使用。



包裝 12mL

(為顧及環保，不另附上攜帶用包裝袋。敬請見諒。)

諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」 電話號碼 0120-127-023 受理時間 9:00~17:00 (週末、例假日除外)

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。