

## 擺脫配戴隱形眼鏡時所產生眼睛疲勞的爽快感

第3類醫藥品

# Sante FX Contact

眼藥

Sante FX Contact 藉由令人眼睛為之一亮的爽快感，擺脫配戴隱形眼鏡時所帶來眼睛疲勞的眼藥水。在補給眼睛能量的同時，還能抑制發炎，減緩隱形眼鏡的不適感。藉由令人眼睛為之一亮的爽快感，救援你長時間使用的眼睛。



除彩色隱形眼鏡外，適用於配戴所有隱形眼鏡狀態下使用。

軟式

O<sub>2</sub>

硬式

拋棄式  
(Disposable)

未配戴隱形眼鏡者亦可使用。

※部分眼藥水無法在配戴軟式隱形眼鏡狀態下使用，請參閱外盒或所附說明書等內容。

### ⚠ 使用注意事項



#### 諮詢事項

- 有以下情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。
  - 正在接受醫師治療者
  - 曾對藥物等產生過敏反應者
  - 有以下症狀者：眼睛有劇烈的刺痛感
  - 以下病症確診者：青光眼
- 使用本藥劑後，若發生以下副作用所引起之症狀，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

關聯部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢
眼睛	充血、搔癢、浮腫、刺痛

- 發生以下狀況時，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。
  - 眼睛的搔癢狀態不見改善
  - 若連續使用2週左右症狀仍不見改善

#### 用法、用量

一次1~3滴、一日點眼5~6次。

#### ●請遵守以下注意事項。


- 使用於兒童身上時，請務必在家長指導監督下使用。
- 容器先端請勿碰觸眼睛、眼瞼、睫毛（可能因混入眼睛分泌物或細菌等而造成藥水污染，或變成混濁等情形）。此外，藥水變混濁時請勿繼續使用。
- 僅作為點眼用藥水使用。
- 請勿於配戴彩色隱形眼鏡時使用。



#### 旋蓋的開封方式

開啟時請務必將旋蓋朝上。

注：擠壓容器中心進行開封時，可能導致藥液噴出。



#### 適應症

眼睛疲勞、預防眼疾（游泳後、灰塵或汗水等進入眼睛時等）、因紫外線或其他光線所造成的眼疾（雪盲症等）、配戴軟式或硬式隱形眼鏡時的不適感、眼睛搔癢、視力模糊（眼睛分泌物較多時等）


#### 成份、含量

成分	含量	作用
牛磺酸	1.0%	活化眼睛的組織代謝。
L-天門冬氨酸鉀	1.0%	提高眼睛組織呼吸。
泛醇	0.1%	補給營養成分(維他命)。
ε-氨基己酸	1.0%	抑制造成發炎之原因物質的生成。

作為添加物，含有依地酸鈉水合物、葡萄糖酸克羅希西汀、氯丁醇、d-龍腦、d-樟腦、l-薄荷腦、pH值調節劑。

#### 保管及使用上注意事項

- 請蓋緊後保管於不受陽光直射的陰涼場所。為維持產品品質，請避免放置於汽車內或靠近暖氣機具等高溫場所。此外，放置於高溫場所後，可能造成容器變形或藥水外漏等使藥水品質劣化，請勿繼續使用。
- 請保存於兒童無法拿取處。
- 請勿以其他容器盛裝。（可能造成誤用或變質。）
- 請避免與他人共用。
- 請勿使用超過保存期限的製品。即使尚未超過保存期限，開封後請於3個月內使用完畢。
- 依保存狀態可能造成容器點眼藥口周圍產生成分結晶，或是在瓶蓋內有白色附著物。請以乾淨的紗布輕輕擦拭後再使用。



#### 包裝 12mL

〔為顧及環保,不另附上攜帶用包裝袋。敬請見諒。〕

#### 諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」電話號碼 0120-127-023 受理時間 9:00~17:00 (週末、例假日除外)

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。