

ส่วนประกอบยาที่มีประสิทธิภาพในระดับความเข้มข้นสูงสุด  
สำหรับดวงตาที่เหนื่อยล้าและเจ็บปวด\*

# Sante Medical 12®

ยากลุ่มที่สอง

ยาจักษุ

เป็นที่ทราบกันดีว่า เราได้รับข้อมูลมากมายผ่านดวงตาของเรา ในสังคมสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการอย่างมาก ทำให้เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องใช้ดวงตา ภายใต้อาการเช่นนี้ทำให้ประสิทธิภาพในการจับโฟกัสของดวงตาลดลง จึงเกิดความรู้สึกหน่วงๆ ที่ด้านหลังดวงตาและเกิดความเมื่อยล้าตา (โรคตาล้า) ได้ง่าย

**Sante Medical 12** เป็นการผสมผสานส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ 12 ชนิดอย่างสมดุล โดยมุ่งเน้น 4 ส่วนประกอบที่มีความเข้มข้นสูงสุด ได้แก่ วิตามินบี 12 และบี 6 โอลิโกสาคคาไรด์ ที่มีประสิทธิภาพในการผ่อนคลายความเมื่อยล้าของดวงตา เป็นยาหยอดตาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับโฟกัสตาที่อ่อนล้าให้ดีขึ้นและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาที่แห้งกร้าน นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสารอาหารที่จำเป็นให้แก่ดวงตาและเสริมสร้างความแข็งแรงของเยื่อตา เราจะสนับสนุน "ชีวิตที่มีวิถีที่คนที่ดีจะเลือก" ให้กับทุกท่านที่อยู่ในสังคมปัจจุบันที่ต้องใช้ดวงตาอย่างหนัก

\* ส่วนประกอบที่มีความเข้มข้นสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางตา : วิตามินบี 12, บี 6, โอลิโกสาคคาไรด์, โซเดียมคอนไดรอกซิมซัลเฟต, คลอโรเฟนิรามีนมาลีเอต



## ⚠️ ข้อควรระวังในการใช้



### ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์

- บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
  - ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาโดยแพทย์
  - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา
  - ผู้ที่มีอาการตาแดง เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง
  - ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคต้อหิน
- กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียง กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย

ค่าที่เกี่ยวข้อง	อาการโรค
ผิวหนัง	ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน
ตา	เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ปายตาแล้วเจ็บ

- หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันที
  - อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น
  - เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้ว 5-6 วัน

## วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

### ● โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

- หากใช้ยาเกินขนาด อาจเกิดอาการแสบตา และทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแตกได้
- ในกรณีที่ต้องการใช้ยานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา (ตัวยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน เนื่องจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและเบดที่เรียก) นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
- อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
- กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น



### สรรพคุณ·ประสิทธิภาพ

ลดอาการตาเมื่อยล้า, เลือดออกใต้เยื่อตา, ตาพร่ามัว (มีเมือกในตา), คันตา, ป้องกันโรคตา (หลังจากว่ายน้ำ, เวลาที่ฝุ่นหรือเหงื่อเข้าตา เป็นต้น), โรคเปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), การอักเสบของดวงตาอันเนื่องมากรังสีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ เป็นต้น), อาการระคายเคืองตาอันเนื่องมากรังสีคอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง

## ส่วนประกอบ·ปริมาณ

ส่วนประกอบ	ปริมาณ	สรรพคุณ
วิตามินบี 12 (โซโนบาลามีน)	0.02%	กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเยื่อตาและบรรเทาความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อตาส่วนที่ปรับโฟกัส
บี 6 (ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด์)	0.05%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
วิตามินบี 6 (ไพริดอกซิน ไฮโดรคลอไรด์)	0.05%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
แพทินอล	0.05%	เพิ่มการหายใจของเนื้อเยื่อตา
โทธริน	0.5%	กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา
คลอเฟนิรามีน	0.03%	ยับยั้งการทำงานของฮิสตามีน, ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ-อาการคันตา
กรดเอปโซลอน	1.0%	ระงับการผลิตสารที่เป็นสาเหตุของอาการอักเสบ
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ	0.1%	ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตา
ซิงค์ซัลเฟตไฮเดรต	0.05%	ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตาด้วยฤทธิ์ต้านการระคายเคือง
เตทริโซลีนไฮดรอกไซด์	0.03%	ระงับอาการเลือดออกใต้เยื่อตา (ส่วนของตาขาว)


สารประกอบ ประกอบด้วย โซเดียม ฮีเตดไฮเดรต, คลอโรฟีนามีน, โซเดียมไฮยาโลรอน, เบนซาลโคเนียมคลอไรด์, กรดบอริก, ดี-โบนีออล, แอล-เมนทอล, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

### <ข้อควรระวังเกี่ยวกับส่วนประกอบ และปริมาณการใช้>

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจรู้สึกหวานในปาก เนื่องจากสารสกัดจากรากชะเอมเทศซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งไหลลงไปในปากผ่านทางท่อน้ำตา ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของคุณภาพยา

### ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษา

- โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป ด้วยยารักษาคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
- โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
- โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา แม้ว่าจะยังไม่ถึงวันหมดอายุ
- อาจจะมีผลยาสีแดงติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาดวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเช็ดออกเบาๆ ด้วยผ้าที่สะอาด
- สีแดงของผลิตภัณฑ์นี้ คือ สีของวิตามินบี 12 (โซโนบาลามีน) ในขณะที่หยอดตา หากตัวยารั่วไหลออกมาและหยดลงบนเนื้อ โปรดล้างออกด้วยน้ำทันที



ขนาดบรรจุ 12 มล.

## ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์” หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 - 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้ง่ายในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย **Santen Pharmaceutical Co., Ltd.**

4-20 โอะดิง-โจ, คิตะ-กุ, โอซาก้า  
www.santen.co.jp