


다래끼와 결막염에

# Sante<sup>®</sup> Medical Antibacterial

제2류의약품

안과약

다래끼는 주변에 있는 세균이 눈꺼풀의 피지선이나 속눈썹 뿌리에 들어가 화농성 염증을 일으켜 눈꺼풀이 붓는 눈의 감염증입니다. 또한, 결막염은 세균이 결막에 감염돼 발생하는 경우가 많고 흰자위가 충혈되거나 눈곱이 많아집니다. Sante Medical Antibacterial은 고점도 약액이 환부에 오랫동안 머물며 효과를 내는 독자적인 약제 설계의 안약입니다. 항균성분 설파메톡사졸이 세균 번식을 억제, 글리시리진산이칼륨이 환부의 염증을 억제하고 타우린과 비타민 B6가 손상된 조직의 신진대사를 촉진합니다. 청결한 1회용 타입, 방부제는 무첨가. 유아(1세 이상)에게도 사용할 수 있는 순한 사용감의 안약입니다.



### ⚠ 사용상의 주의

**⊗ 금지 사항**  
(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용이 나타나기 쉽습니다)  
장기 연속하지 마십시오.

**👤 문의가 필요한 경우**

- 다음과 같은 사람은 사용하기 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
  - (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
  - (2) 약 등으로 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
  - (3) 다음과 같은 증상이 있는 사람  
심한 눈의 통증
- 사용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.

관계 부위	증 상
피부	발진, 발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부종, 따갑고 아프다

- 3~4일 사용해도 증상이 개선되지 않을 때는 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.

### 용법 및 용량

1회 1방울, 1일 3~5회 점안해 주십시오.

● 다음의 주의 사항을 지켜 주십시오.

- (1) 어린이가 사용할 때는 보호자가 지도 감독해 주십시오.
- (2) 용기 끝을 눈이나 눈꺼풀, 속눈썹 등에 닿지 않도록 하십시오.
- (3) 소프트 콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마십시오.
- (4) 점안용으로만 사용해 주십시오.




### 1회용 타입

한 번 연 용기는 점안 후 약액이 남아 있어도 반드시 버리십시오.

● 여는 방법

뚜껑 부분을無理하게 비틀지 말고 천천히 돌려서 열어 주십시오.



### 효능 및 효과

다래끼, 결막염(유행성 결막염), 안검염(눈꺼풀의 염증), 눈의 가려움  
**'다래끼' 관련 주의 사항:** 눈꺼풀을 문지르거나 기타 눈에 자극을 주지 않도록 주의하시기 바랍니다. (단, 다래끼는 체질적으로 생기기 쉬운 경우가 있으므로 과로나 수면 부족 등 체력이 저하했을 때 생기기 쉬우므로 과로를 피하고 충분한 수면을 취해주시기 바랍니다.)

### 성분 및 용량

성분	분량	효능
설파메톡사졸(항균성분)	4.0%	지속성 설파제로 다래끼나 결막염의 원인균에 항균 작용합니다.
글리시리진산이칼륨	0.25%	환부의 염증을 억제합니다.
타우린	1.0%	눈 조직의 신진대사를 활발히 합니다.
비타민 B6	0.1%	눈 조직의 신진대사를 활발히 합니다.


에데트산나트륨수화물, 하이프로멜로스, 붕산, pH 조절제를 함유합니다.

### (성분 및 분량 관련 주의 사항)

이 약제는 점안 후 입안에 쓴맛 또는 단맛을 느낄 수 있습니다. 이것은 주성분 설파메톡사졸 및 글리시리진산이칼륨이 누도(눈물길)를 통과해 입안으로 흘러 들어가 생기는 현상으로 물질 등의 이상은 아닙니다.

### 보관 및 취급상의 주의

- (1) 직사광선이 닿지 않는 선선한 곳에 보관해 주십시오. 제품 품질을 유지하기 위해 자동차 안이나 난방기구 가까이 등 고온이 되는 장소에 두지 마십시오. 또한, 고온이 되는 장소에 보관하면 용기가 변형돼 약액이 새거나 약액 품질이 저하될 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- (3) 다른 용기에 바꿔넣지 마십시오.  
(오용 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- (4) 다른 사람과 공용하지 마십시오.
- (5) 이 약제는 빛에 의해 약액이 변질하는 것을 방지하기 위해 착색 용기 및 착색 봉지를 사용하고 있지만, 보관할 때도 상자에 넣는 등 빛이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- (6) 바지 주머니 등에 제품을 넣으면 뚜껑이 열릴 수 있으므로 주의하십시오.
- (7) 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용 기한 내라도 봉지를 개봉 후 가능한 한 빨리 사용해 주십시오.



포장 0.3mL×20개입

### 문의처

상품 내용에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 하기 고객센터로 하시기 바랍니다.  
산텐제약주식회사 [고객상담실] 전화번호 0120-127-023 접수시간 9:00~17:00 (토요일, 일요일, 경축일은 제외)  
문의하신 내용은 정확성을 기하기 위해서 또 답변의 질 유지 및 향상을 위해 통화 내용을 녹음하고 있습니다.