

用於眼部炎症、眼疲勞 Sante PC[®]

第2類醫藥品

眼藥

修護藍光等造成的光損傷

從電腦或智慧型手機螢幕發出的藍光，即所謂的 Blue Light 等，每天一點一點地對眼睛帶來負擔。
Sante PC 添加了最大濃度配比*的改善眼睛焦點調節功能的維生素B₁₂和保護角膜的硫酸軟骨素鈉、促進受損眼部組織代謝的維生素B₆。透過8種成分改善眼部炎症和眼疲勞等，讓眼睛倍感舒適。
有效改善經常直盯電腦或智慧型手機者的眼疲勞症狀。

*一般用眼科用藥製造銷售認證標準的最大濃度配比：維生素B₁₂、硫酸軟骨素鈉、維生素B₆



使用注意事項

諮詢事項

- 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 正接受醫生治療的人
 - 曾因藥物等引起過敏症狀的人
 - 有以下症狀的人
劇烈的眼睛疼痛
 - 曾接受以下診斷的人
青光眼
- 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹、泛紅、瘙癢
眼睛	充血、瘙癢、腫脹

- 以下情形請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 視線模糊未改善時
 - 使用5~6天症狀依然未改善時

用法、用量

一次1~3滴、一日點眼5~6次。

●請遵守以下注意事項。

- 若是過度使用，會感覺到異常的眩光，或是反而引起充血。
- 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛（因為可能混入了眼屎或雜菌，會汙染藥液或使藥液混濁）。另外，請勿使用混濁的藥劑。
- 請勿在佩戴著軟式隱形眼鏡時使用。
- 請只用於點眼。




旋蓋的開封方式

開啟時請務必將旋蓋朝上。

注：擠壓容器中心進行開封時，可能導致藥液噴出。



●開啟方式
將瓶蓋向著自己轉開。



●關閉方式
直到鎖緊前都要確實壓住。

適應症

預防由紫外線等光線引起的眼部炎症（如雪盲等）、眼疲勞、結膜充血、眼科疾病（如游泳後，灰塵、汗水進入眼睛時等情況）、視線模糊（結膜分泌物過多時等）、眼部瘙癢、眼瞼炎（眼瞼接觸性皮炎）以及佩戴硬性隱形眼鏡時的不適感

成分、含量

成分	含量	作用
維生素B ₁₂ （氰鈷胺）	0.02%	活化睫狀肌的作用，改善眼疲勞。
硫酸軟骨素鈉	0.5%	藉防止淚液蒸發的作用，為雙眼帶來滋潤。
維生素B ₆ （鹽酸吡哆醇）	0.1%	活化眼睛組織的代謝。
甲基硫酸新斯的明	0.002%	利用焦點調節功能改善作用，改善眼疲勞等。
牛磺酸	0.1%	活化眼睛組織的代謝。
甘草酸二鉀	0.1%	抑制眼部炎症。
撲爾敏	0.01%	抑制組胺的作用，緩解眼部炎症、眼部瘙癢。
鹽酸四氫唑啉	0.03%	抑制結膜（眼白部分）的充血。


作為添加物，含有氨基己酸、依地酸鈉水合物、氯丁醇、香葉醇、右旋糖酐、羥乙基纖維素、羥基萘胺、聚山梨醇酯80、d-樟腦、l-薄荷醇、滲透壓調節劑、Ph值調節劑。

〈成分、容量相關的注意事項〉

本劑於點藥後，偶爾會有在嘴裡感覺到甜味的情況。這是由於其中的甘草酸二鉀成分透過淚腺進入嘴裡而導致的，並非因品質等方面的異常所引起。

保管及操作注意事項

- 請控緊後保管在不會直接照射到陽光的陰涼場所。為保持產品品質，請勿放置在汽車內或接近暖氣設備等高溫場所。另外，放置於高溫場所後，會有容器變形、藥液漏出、藥液品質劣化等疑慮，請勿使用。
- 請保管在幼小孩童拿不到的地方。
- 請勿換裝到另一個容器。
(會導致誤用或造成品質的改變。)
- 請勿與他人共用。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。開封後，即使尚在使用期限內，亦請盡快使用。
- 依保存狀態的不同，在容器的點藥口周圍或瓶蓋內側會有紅色的成分物結晶。此種情況下，請用清潔的紗布輕輕擦拭後使用。
- 本藥劑的紅色是維生素B₁₂（氰鈷胺）的顏色。點藥中因藥液灑落而使襯衫等染色時，請盡速用清水沖洗。



包裝 12mL

諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」電話號碼 0120-127-023 受理時間 9:00~17:00（週末、例假日除外）

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。