

콘택트렌즈 착용 시의 불편감 및 눈 피로에 Sante PC[®] Contact

제3류의약품

안약

블루라이트 등에 의한 빛 손상을 케어

스마트폰이나 컴퓨터 화면에서 나오는 청색빛, 즉 블루라이트는 매일 조금씩 눈에 부담이 되고 있습니다. 'Sante PC Contact'는 이 블루라이트 등에 의한 눈의 염증과 눈의 피로를 개선하는 안약. 콘택트렌즈를 착용한 채 사용할 수 있습니다. 손상된 눈 조직의 신진대사를 촉진하는 비타민 B6에 더해 스마트폰이나 컴퓨터로 피로해진 눈의 초점 조절 기능을 개선하는 네오스티그민메틸황산염, 오래 착용한 콘택트렌즈로 손상된 각막의 회복을 도와주는 플레빈 아데닌 디뉴클레오티드 나트륨(활성형 비타민 B2)을 최대 농도 배합*. 또한, 엽실론-아미노카프로산이 눈의 염증을 억제합니다. 스마트폰이나 컴퓨터를 오래 사용하는 일이 많은 콘택트렌즈 사용자의 눈 피로에 효과를 발휘하는 안약입니다.

*일반용 안과용 약 제조 판매 승인 기준의 최대 농도



**컬러 콘택트렌즈는 제외
모든 콘택트렌즈 착용 중에 사용할 수 있습니다.**

소프트	O ₂	하드	일회용 (디스포저블)
-----	----------------	----	----------------

콘택트렌즈를 착용하지 않은 분도 사용하실 수 있습니다.
※소프트 콘택트렌즈를 착용한 채 사용할 수 없는 안약도 있으므로 걸 상자나 첨부 문서를 잘 확인하시기 바랍니다.

⚠ 사용상의 주의

문제가 필요한 경우

- 다음과 같은 사람은 사용하기 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 약 등으로 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
 - 다음과 같은 증상이 있는 사람
심한 눈의 통증
 - 다음과 같은 진단을 받은 사람
녹내장
- 사용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.

관계 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
눈	충혈, 가려움, 부종, 따갑고 아프다
- 다음과 같은 경우는 사용을 중지하고 이 문서를 지참하고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 문의하시기 바랍니다.
 - 눈의 침침함이 개선되지 않을 경우
 - 2주일 정도 사용해도 증상이 개선되지 않을 경우

용법 및 용량

1회 1~3방울, 1일 5~6회 점안해 주십시오.

● 다음의 주의 사항을 지켜 주십시오.

- 어린이가 사용할 때는 보호자가 지도 감독해 주십시오.
- 용기 끝을 눈이나 눈꺼풀, 속눈썹 등에 닿지 않도록 하십시오 (눈곱이나 잡균 등이 들어가 약액이 오염되거나 혼탁해질 수 있습니다). 또한, 혼탁해진 제품은 사용하지 마십시오.
- 점안용으로만 사용해 주십시오.
- 컬러 콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마십시오.



트위스트캡의 개봉 방법

반드시 캡을 위로 하고 열어 주십시오.
주의: 용기 중심을 누른 채 열면 약액이 밀려나올 수 있습니다.



효능 및 효과

자외선 및 기타 광선에 의한 안염(설명 등), 눈의 피로, 눈병 예방(수영 후, 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때 등), 눈의 침침함(눈곱이 많이 끼었을 때 등), 눈의 가려움, 소프트 콘택트렌즈 또는 하드 콘택트렌즈를 착용하고 있을 때의 불편감


성분 및 용량

성분	분량	효능
비타민 B6(피리독신염산염)	0.1%	눈 조직의 신진대사를 활발히 합니다.
네오스티그민메틸황산염	0.005%	초점 조절 기능 개선 작용으로 눈의 피로 등을 개선합니다.
플레빈 아데닌 디뉴클레오티드 나트륨 (활성형 비타민 B2)	0.05%	각막 조직 등의 신진대사를 촉진해 회복을 도와줍니다.
엽실론-아미노카프로산	1.0%	염증 원인 물질의 생산을 억제합니다.

에데트산나트륨수화물, 소브산, 맥스트란, 히알루론산나트륨, 하이드록시에틸셀룰로스, 붕산, 붕사, 등장화제, pH 조절제를 함유합니다.

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 선선한 곳에 꼭 닫은 상태로 보관해 주십시오. 제품 품질을 유지하기 위해 자동차 안이나 난방기구 가까이 등 고온이 되는 장소에 두지 마십시오. 또한, 고온이 되는 장소에 보관하면 용기가 변형돼 약액이 새거나 약액 품질이 저하될 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 다른 용기에 바꿔넣지 마십시오. (오용 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 다른 사람과 공유하지 마십시오.
- 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용 기한 내라도 개봉 후는 약 3개월을 기준으로 사용해 주십시오.
- 보존 상태에 따라서는 성분의 결정이 용기 점안 입구 주위나 뚜껑 안쪽에 노랗게 낄 수 있습니다. 그런 경우는 청결한 거즈로 닦아낸 후 사용해 주십시오.
- 이 약제의 노란색은 플레빈 아데닌 디뉴클레오티드 나트륨(활성형 비타민 B2) 색입니다. 점안 중에 실수로 약액이 셔츠 등이 묻은 경우는 빨리 물빨래해 주십시오.



포장 12mL

문의처

상품 내용에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 하기 고객센터로 하시기 바랍니다.
산텐제약주식회사 [고객상담실] 전화번호 0120-127-023 접수시간 9:00~17:00 (토요일, 일요일, 경축일은 제외)
문의하신 내용은 정확성을 기하기 위해서 또 답변의 질 유지 및 향상을 위해 통화 내용을 녹음하고 있습니다.