

# 用於配戴隱形眼鏡時的不適感、眼疲勞

## Sante PC<sup>®</sup> Contact

第3類醫藥品

眼藥



### 修護藍光等造成的光損傷

智慧型手機或電腦螢幕發出的藍光，即所謂的 Blue Light 等，會對眼睛造成負擔。Sante PC Contact 眼藥水可保養因此般藍光等對眼睛造成的炎症或疲勞。配戴著隱形眼鏡時也能點用此藥水。添加了最大濃度比\*的促進受損眼部組織代謝之維生素B<sub>6</sub>、改善因智慧型手機或電腦造成的眼疲勞調焦功能之甲基硫酸新的明、促進因長時間配戴隱形眼鏡的受損角膜修復之黃素腺嘌呤二核苷酸鈉（活性型維生素B<sub>2</sub>）。此外，ε-氨基己酸可抑制眼睛炎症。

有效改善經常盯看智慧型手機或電腦，且配戴隱形眼鏡者的眼睛疲勞症狀。

\*一般用眼科用藥製造銷售認證標準的最大濃度配比

除了彩色隱形眼鏡以外  
所有隱形眼鏡皆可配戴著時使用本眼藥水。

軟式隱形眼鏡

O<sub>2</sub>

硬式隱形眼鏡

拋棄式隱形眼鏡  
(可拋型)

未配戴隱形眼鏡者也可以使用。

※有些眼藥水是配戴著軟式隱形眼鏡時不能使用的，請詳細確認外箱和隨附說明書。

### 使用注意事項

#### 諮詢事項

- 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
  - 正接受醫生治療的人
  - 曾因藥物等引起過敏症狀的人
  - 有以下症狀的人  
劇烈的眼睛疼痛
  - 曾接受以下診斷的人  
青光眼
- 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹、泛紅、瘙癢
眼睛	充血、瘙癢、腫脹、刺痛

- 以下情形請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
  - 視線模糊未改善時
  - 使用約2星期症狀依然未改善時

### 用法、用量

一次1~3滴、一日點眼5~6次。

#### ●請遵守以下注意事項。

- 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛（因為可能混入了眼屎或雜菌，會污染藥液或使藥液混濁）。另外，請勿使用混濁的藥劑。
- 請只用於點眼。
- 請勿在佩戴著彩色隱形眼鏡時使用。




### 旋蓋的開封方式

開啟時請務必將旋蓋朝上。

注：擠壓容器中心進行開封時，可能導致藥液噴出。



●開啟方式  
將瓶蓋向著自己轉開。



●關閉方式  
直到鎖緊前都要確實壓住。

### 適應症

預防因紫外線等光線引起的眼部炎症（如雪盲等）、眼疲勞、眼科疾病（如游泳後，灰塵、汗水進入眼睛時等情況）、視線模糊（結膜分泌物過多時等）、眼部瘙癢、配戴軟性或硬性隱形眼鏡時的不適感


### 成分、含量

成分	含量	作用
維生素B <sub>6</sub> （鹽酸吡哆醇）	0.1%	活化眼睛組織的代謝。
甲基硫酸新的明	0.005%	利用焦點調節功能改善作用，改善眼疲勞等。
黃素腺嘌呤二核苷酸鈉（活性型維生素B <sub>2</sub> ）	0.05%	促進角膜等組織代謝與修復。
ε-氨基己酸	1.0%	緩解造成炎症成因物質的產生。

作為添加物，含有依地酸鈉水合物、山梨酸、右旋糖酐、玻尿酸鈉、羥乙基纖維素、硼酸、硼砂、滲透壓調節劑、pH值調節劑。

### 保管及操作注意事項

- 請控緊後保管在不會直接照射到陽光的陰涼場所。為保持產品品質，請勿放置在汽車內或接近暖氣設備等高溫場所。另外，放置於高溫場所後，會有容器變形、藥液漏出、藥液品質劣化等疑慮，請勿使用。
- 請保管在幼小孩童拿不到的地方。
- 請勿換裝到另一個容器。（會導致誤用或造成品質的改變。）
- 請勿與他人共用。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。另外，開封後，即使尚在使用期限內，亦請約3個月內使用。
- 依保存狀態的不同，在容器的點藥口周圍或瓶蓋內側會有黃色的成分物結晶。此種情況下，請用清潔的紗布輕輕擦拭後使用。
- 本藥劑的黃色是黃素腺嘌呤二核苷酸鈉（活性型維生素B<sub>2</sub>）的顏色。點藥中因藥液灑落而使襯衫等染色時，請盡速用清水沖洗。



包裝 12mL

### 諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」電話號碼 0120-127-02 受理時間 9:00~17:00（週末、例假日除外）

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。