

人工泪液型点眼剂 Soft Santear®

第3类医药品

Soft Santear 是拥有与泪液相似性质的人工泪液，可改善由于泪液不足带来的眼部干涩、异物感等不适症状。

此外，由于 Soft Santear 已被证实不会对隐形眼镜造成任何影响，所以可于佩戴各类隐形眼镜 [软性、O₂、硬性、丢弃型 (日抛)] 时点眼。此外，已被诊断为干眼症的人，建议定期接受眼科检查。



⚠ 使用注意事项

需要咨询的情况

- 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - 正在接受医生治疗的人
 - 曾经因为药物出现过敏症状的人
 - 有以下症状的人
眼睛剧烈疼痛
 - 被诊断为以下疾病的人
青光眼
- 使用后如果出现下列症状，有可能是出现了副作用，请立即停止使用，携带本说明书前往咨询医生、药剂师或注册销售者。

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒、肿胀

- 以下情况请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者。
 - 视线模糊未能得到改善的情况
 - 使用了2周，症状未得到改善的情况

用法、用量

一次2~3滴，一天点眼5~6次。

●请遵守以下注意事项。

- 儿童使用时，必须要在监护人的监督指导下使用。
- 请勿将眼睛、眼睑、睫毛接触到容器口 (结膜分泌物或细菌等有可能会混入眼药中污染眼药或造成眼药混浊)。此外，请勿使用已经混浊的眼药。
- 只能作为点眼使用。

开口方法

将瓶盖一直旋转至瓶肩处……



点眼口就会开口。

适应症

缓解佩戴硬性隐形眼镜或软性隐形眼镜的不适感、补充泪液 (眼部干涩)、眼疲劳、视线模糊 (结膜分泌物过多时等)

成分、分量

成分	分量
氯化钾	0.1%
氯化钠	0.4%

作为添加物，本品中含有硼酸、pH调节剂。

制剂的性状

pH	7.0~8.0
渗透压比	0.90~1.20
性状	无色透明、无菌水性点眼剂

保管及使用时的注意事项

- 使用前请勿将盖子拧进去。
- 请放在阳光不能直射的阴凉处密封保管。为了保持产品的品质，请勿放置在汽车内或靠近取暖设备等的高温场所。已经放置在高温场所的产品，有可能会出现容器变形、药液泄漏、药液品质劣化，因此请勿继续使用。
- 请放在儿童触及不到的地方妥善保管。
- 请勿替换到其他容器中。
(有可能造成误用或品质变质。)
- 请勿与他人共同使用。
- 请勿使用超过使用有效期的产品。另外，即使是在使用有效期内，开封超过10天后，请勿使用剩余的药液。
- 根据保存状态的不同，成分的结晶有可能会令容器的点眼口附近或瓶盖内侧变白。这时请用清洁的纱布轻轻擦拭干净。

包装 5mL×4瓶

咨询

有关商品内容的咨询，请联系您购买商品的店铺或者下述联系方式。

参天制药株式会社 “顾客咨询室” 电话号码 0120-127-023 受理时间 9:00~17:00 (周末、节假日除外)

为了获得咨询内容的正确性，以及为了维持并提高回答的质量，电话将会被录音。