

2004年7月20日

各位

## 抗リウマチ剤「メトレート<sup>®</sup>錠 2mg」新発売について

参天製薬株式会社（本社：大阪市 社長：森田隆和）は抗リウマチ剤「メトレート<sup>®</sup>錠 2mg」（一般名：メトトレキサート）を発売することになりました。メトレート<sup>®</sup>錠 2mg は、メトトレキサートを主成分とする抗リウマチ剤で、低用量間欠投与法による関節リウマチに対する有用性が認められています。参天製薬は、すでに「リマチル<sup>®</sup>錠」や「アザルフィジン<sup>®</sup> E N錠」などの抗リウマチ剤を販売しておりますが、このたび「メトレート<sup>®</sup>錠 2mg」が加わることで、同領域でのラインナップがさらに強化され、関節リウマチ患者さん一人ひとりの病態に合わせたよりきめ細かい治療提案が可能となります。

発売日 2004年7月20日

商品名 メトレート<sup>®</sup>錠 2mg (Metolate<sup>®</sup> tablets 2mg)

包装単位 (PTP) 48錠 (12錠×4、服薬指導シート12枚付)

### 1. 製品特性

- ・メトトレキサートを1錠中に2mg含有する抗リウマチ剤です。
- ・剤形は割線入りの錠剤です。
- ・投与方法は週間低用量間欠投与法です。
- ・重大な副作用としてショック、アナフィラキシー様症状、骨髄抑制、感染症、重篤な肝障害・腎障害・皮膚障害・腸炎、間質性肺炎、肺線維症、膵炎、骨粗鬆症があらわれることがあります。

### 2. 効能効果

慢性関節リウマチ（過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤および他の抗リウマチ剤により十分な効果の得られない場合に限る。）

### 3. 用法・用量

通常、1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし、本剤1錠（メトトレキサートとして2mg）を初日から2日目にかけて12時間間隔で3回経口投与し、残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。

なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減する。ただし、増量する場合はメトトレキサートとして1週間単位で8mgまでとし、12時間間隔で3回経口投与する。

### 4. 薬価

1錠 284.00円

以上