

・ **持病に喘息がある（または、過去に喘息になったことがある）かたへ**

喘息および過去に喘息になったことのある方については、タプコム[®]配合点眼液は**禁忌***（**使用してはいけない**）となっておりますので、使用することはできません。

既にご使用の場合は、ただちに中止のうえ、速やかに処方した医師に喘息であること／過去に喘息であったことをお伝えいただき、ご相談をお願いいたします。

使用により、息苦しいなどの喘息のような症状が出ている場合は、**ただちに処方した医師にご連絡をお願いいたします。**

・ **持病に心不全、徐脈などの心臓の疾患があるかたへ**

コントロール不十分な心不全、洞性徐脈などの方については、タプコム[®]配合点眼液は**禁忌***（**使用してはいけない**）となっておりますので、使用することはできません。

既にご使用の場合は、**ただちに中止のうえ、速やかに処方した医師にご自身の心臓疾患・治療状況などについてお伝えいただき、ご相談をお願いいたします。**

*禁忌とは：（医薬品医療機器総合機構：PMDAのホームページより）

当該医薬品を使用してはいけない患者を記載しています。

以下のような点から考えて、ある医薬品を使用することにより、病状が悪化したり、副作用が起こりやすくなったり、薬の効果が弱まるなどの可能性が高いため、使用しないこととされています。

- 現在の病気（原疾患）
- ある病気が原因となって起こる別の病気（合併症）
- これまでにかかった病気（既往歴）
- ご家族の方の病気（家族歴）
- 現在使われている他のお薬（併用薬剤）
- 医薬品を使用する方の体質

など